

方式、品種特性和氣象條件等不同，各地的插植期稍為不同。
坡地因為缺乏水源灌溉，甘藷植期應和降雨期配合，使生育初期有相當的降雨量，方可得到好的收成。

水平淺植、斜植、密植

插植的方法，和塊根着生、形狀大小以及收量多少，都有很大的關係。土壤含有相當濕度時，以水平淺植為最理想，並須配合淺的培土，使塊根容易肥大；因為水平淺植和淺培土，是甘藷增收的重要工作。

如果土壤太乾燥，則以斜植為宜。

插植的密度，要看品種特性、環境和甘藷用途等不同來決定，但為增加單位面積產量，必須施行有密度的密植。一般以行距一公尺，株距〇三公尺為宜。

尺為宜。如能採用短苗雙行植。也可以提高單位面積的產量。

中耕、培土、勤翻蔓

甘藷植後一個月左右，應行中耕、追肥和培土，使土壤疏鬆，以利根部發育。培土不宜高過原畦，這樣才可促進塊根肥大。

翻蔓的主要目的，在防止地上部節發根，幫助塊根肥大，尤其在坡地種甘藷，生育初期為雨季，如果土壤過濕或生育很旺盛時，須行翻蔓一至二次。

蟲害猖獗，注意防治

在坡地種甘藷，因為表土淺，容易乾燥，所以蟲害特別猖獗，應特別注意防治。

每公頃應用四〇〇「阿特靈」可濕性粉劑六公升，在種植前整地耕犁時撒佈土中，以防治地

下害蟲。

甘藷插植前，以稀釋為一百至二百倍的二十五%DDT乳劑浸甘藷苗一分鐘，又在生育期中，向莖基部噴施一次，於生育三個月後塊根肥大時，再在畦上塊根頭部出土面的裂縫處噴酒一至二次稀釋為一百倍的二十五%DDT乳劑，則更有效果。

＊

＊

＊

△農業廣播消息▽

臺中區農業改良場「好農村」農業廣播，六月十七日「蘭鵝」，六月二十日「山羊的疾病防治」，六月二十四日「為害水稻的蚯蚓」，六月二十七日「豬品種與雜交的必要性」。

播出電聲和時間是申廣臺中臺第二廣播，下午七時五十分至八時。

第一期裏作黃仔糊土肥水排灌注意

生 薑 林

灌溉排水

本省中南部的水稻田，在第一期作和第二期作中間有一段休閑期。這段時間，除了瓜類，還可以栽培糊仔黃麻（請看上期「豐年」），增加收益。

第一期糊仔黃麻移栽麻苗時，恰好是雨季，麻田如有積水，應隨時注意排除。但如久旱不雨，下部麻葉凋萎，則應即時引水灌溉。

黃麻收穫前半月，田間積水可以不必排除，用以儲備後作水稻所需要的水量，兼使黃麻剝皮容易。

缺株補植

麻苗移栽後三至五天，如有缺株，應選取較強健高大的麻苗立即補植。

傷麻株。

移栽黃麻後十至十五天收穫水稻，水稻要儘量低割，並且注意不可損壞疏鬆。普通多在施肥前舉行中耕除草。

施肥培土

黃麻生長期施用充分肥料，不但黃麻本身可以豐收，後作水稻也不會因栽培黃麻而引起養分不足的现象。
依據肥料試驗結果，每公頃應施堆肥一至二萬公斤，硫酸銨六百六十公斤，過磷酸鈣二百二十公斤，氯化鉀一百公斤。
堆肥和磷肥在水稻收穫後立即用小鋤頭在黃麻根際開一淺溝深約二至三公分施用。其他肥料隔兩星期後再在麻株另一側開溝施用，然後舉行培土。培土高度約為十公分。

怎樣收穫？

第一期裏作糊仔黃麻後，如希望栽培第二期水稻，應在八月初以前收穫黃麻。如果後作不栽培水稻而改種其他作物（大豆、甘藷等），則可延遲收穫期，使黃麻充分生長增加產量。

收穫黃麻應儘量低割，最好使用特製弧形鐮，先切去四週支根後連根拔起，這樣收到的麻株比較幼嫩，剝得的幼麻品質較好。如欲製作精洗麻，應切除根部剝皮後立即浸水。黃麻收穫後立即施用堆肥耕翻耙平，種植第二期水稻或其他作物。

