

家畜的口炎

如何治療

——元培季——

口炎是怎

麼樣的？

，腫脹，口溫增高，舌背有深灰色或褐色舌苔，唇頰有時浮腫，唇和口角的皮膚有時見爛斑，採食咀嚼都變慢或停止，口水開始減少而致口乾燥，流涎，很痛。

我們發現有這許多徵狀判定是口炎時，最好立刻除去發病的原因，如變換飼料，改變用具，拔除異物，整理牙齒等。如果是其他疾病引起的，則先治原來的病。

處理口炎

的方法。

用濃茶水亦可代埋。(4)百分之十濃度的醋酸。(5)百分之〇·五至二濃度的重碳酸鉀即小蘇打。(2)百分之二至三濃度的硼酸。(3)百分之二至五濃度的明礬或單寧酸或三濃度的過氧化氫即雙氧水，(7)百分之一濃度的鹽水。(8)百分之二至四濃度的氯酸鉀。如口腔內有爛斑和潰瘍，則可選用下列藥液塗佈：(1)百分之一至十濃度的硝酸銀但小畜要改用低濃度。(2)盧戈氏溶液。(3)碘甘油用一份碘和五份甘油配成。(4)碘蜂蜜，用一份碘和十份蜂蜜配成。(5)碘酒。

以上所用的藥物，市面上都可以買得到，所謂百分之幾濃度藥液的配法，例如「百分之二的濃度」就是每一百西西水裏含藥二公分或二西西。藥液中所用的水，最好應用蒸餾水。所用棉拭子每用一次後就要換掉另換一個，灌注器每用一次後應洗淨，不可連援使用。

用泥土覆蓋而改用石塊磚頭的，過滑的腐敗會增加。
三、最初三天，青貯料逐漸下降，在這期間要常常加土壓緊過滑，避免空氣進入。
四、裝填時週沿假如沒有特別緊緊，將使邊沿容易腐敗。如果雨水聚集並進入青貯料內，會影響青貯料的醱酵。

五、生甘諸簽拌合米糠的比例，應按甘諸簽的情形作適當的調整。例如：生甘諸簽未經萎凋的要配合米糠三成；如果日曬風吹四小時後，要配合米糠兩成；等到萎凋六小時以上已軟化時，要配合米糠一成半，如果沒有按照前述情形調整比例的，青貯便不容易成功。(農復會畜牧生產組)

家畜患了口炎，常不能採食飼料和飲水，因而影響健康，減少疾病的抵抗力。如不及時處理，會引起種種疾病，特別是脫水症。

為何會發

生口炎？

引起家畜口炎的原因很多，如飼料粗硬，尖銳物的損傷，齶傷，齒齦不正，植物芒刺，昆蟲細毛，過熱食飼料，有毒植物，腐蝕性或刺激性藥品等吞食時也都可以引起口炎。另如其他疾病齒齦炎、咽炎、胃腸病、佝僂病、貧血和壞血病等也是口炎的原因之一。而哺乳仔畜如果吮食患有乳房炎等傳染病母畜的乳汁，仔畜也會發生口炎。

普通家畜患口炎後，如因食物等損傷而引起的，經一、二星期可痊癒，但是因為其他疾病而繼發的，則需視該等疾病的情況而定。

口炎的徵狀：普通口腔粘膜呈斑狀或變紅，表面蓋有粘液，知覺過敏，

此外可選用下列各種藥液洗口，或用棉拭子蘸藥液擦拭，或用灌注器灌注藥液入口腔。常用藥液如下：(1)百分之二至五濃度的重碳酸鉀即小蘇打。(2)百分之二至三濃度的硼酸。(3)百分之二至五濃度的明礬或單寧酸或三濃度的過氧化氫即雙氧水，(7)百分之一濃度的鹽水。(8)百分之二至四濃度的氯酸鉀。

如口腔內有爛斑和潰瘍，則可選用下列藥液塗佈：(1)百分之一至十濃度的硝酸銀但小畜要改用低濃度。(2)盧戈氏溶液。(3)碘甘油用一份碘和五份甘油配成。(4)碘蜂蜜，用一份碘和十份蜂蜜配成。(5)碘酒。

以上所用的藥物，市面上都可以買得到，所謂百分之幾濃度藥液的配法，例如「百分之二的濃度」就是每一百西西水裏含藥二公分或二西西。藥液中所用的水，最好應用蒸餾水。所用棉拭子每用一次後就要換掉另換一個，灌注器每用一次後應洗淨，不可連援使用。



，(一第信守)誌代大用信人做
，理合不界上約失那
，已得不一萬是那
。知通去時及愛着

，(情事壞破)代歹尤狂在青性急有
，在的所房臥室內
！我哀就去入白黑

，記會愛一第潔整
，潔清洗愛着手雙那
，進經已手撫(洗不)無雙
！(至之耻羞)死笑見手黑雙一