

• 生進王 •

期乏缺菜蔬季夏

茄番和菜白藍甘種可

本省從七月開始到十月，因受颱風和驟雨的影響，蔬菜生產減少，價格一直看好，尤以番茄、結球白菜和甘藍三種，售價最高。

如能在這段時間選擇耐熱耐濕的品種，適當管理栽培，一定可以獲得利益的。

根據在臺北市中央市場二年來的調查統計，番茄的價格，從七月開始一直上升；因為平地的春季番茄和在海拔三百至四百公尺栽培的番茄，都在七月上旬收穫完畢，七八月後供應量激減，售價也因之急昇。以後的番茄消費，只由海拔六百三十公尺以上的地區供應，在十月下旬以前，每公斤售價都在六元以上。

甘藍在六至九月間，由海拔四百五十至七百公尺的地區供應，因為栽培面積大，品質又差，價格並不高。直到九月以後，因受颱風和高溫多濕的影響，並且平地葉菜類缺乏，價格才開始攀高，一直維持到十月上旬。

結球白菜在六月間由海拔四百五十公尺的地區供應，直到七月起，只在海拔七百公尺的地區生產，供應量減少，價格升高。尤其在八月間有颱風來襲，價格更為上昇。

茲根據上面市場價格變動情形，將這三種蔬菜的夏季栽培方法分別說明，以供各位菜農參考：

甘藍

七月中旬到九月中旬的甘藍，應由海拔四百五十公尺的地區供應。因為海拔四百五十公尺的地區，在颱風期不致淹水，而且可以選擇較為避風的地點栽培。定植期是五月下旬到六月上旬，品種以「

初秋」、「坂田中早生」為佳。


如在平地栽培，應該調節播種期，使甘藍在九月上旬以後（即白露節以後）開始結球，才不會發生嚴重的腐爛。就是說，應在七月間開始育苗，八月間選擇位置較高排水良好的土地定植。品種以「宇治綠」、「坂田中早生」和「脫普」為佳。颱風對平地七月播種的甘藍打擊很大，所以應選已設有防風林的田地栽培。在颱風來襲時，用稻草把蓋在植株上，讓稻草吸收水分固定植株，也可以避免植株根部動搖而引起腐爛。颱風過境後除去稻草把，不致妨害生長和結球。這樣到九月下旬，就可開始採收應市。

結球白菜

六、七月間的結球白菜，應由高冷地供應，通常在四月上旬播種。以往都栽培「長岡交配二號」，但是本品種容易發生軟腐病，今後宜改種「長岡交配六〇天」或「濱光」，以減少損害。

八月到十月下旬，過去都栽培黑葉系統漳浦白菜。本系統極早生且耐熱，在高溫下結球率很高，適合水園式栽培，但對軟腐病和病毒病抵抗力不强，單位面積產量並不高。

栽培架支立直茄番



番茄

七月中旬到十月下旬，本省番茄

今後如能勵行畦面覆蓋，配合高畦栽培，少用人糞尿，則似可減輕軟腐病的為害。「濱光」和「濱綠」兩品種的耐熱性和漳浦白菜略同，值得試試。

供應不太理想，主要原因是遭受颱風的影響。所以，番茄應選避風，並有防風林的地點栽培。


在平地八月上旬播種，九月上旬定植，十月下旬開始供應。在栽培技術上因可利用「番茄多旺」處理花房提高著果，生產是沒有問題的。只有颱風損失，是一種威脅，所以要

想早期栽培番茄，應事前種防風林（如觀音竹等），以免遭受颱風損害。颱風來襲前，將番茄植株向一面（順風向）推倒地面，更可以減少損失。為便利這項工作，應將現有合堂式支架改為直立式支架。

食用甜菜可以餵豬

本省目前作為養豬飼料的甜菜，都是食用甜菜。食用甜菜含有炭水化合物、鈣、鐵、蛋白質和維生素乙、丙等，營養價值並不高，以作粗飼料為宜。

適宜中部栽培的食用甜菜品種有 Detroit Dark Red (デトロイト、ダーク、レッド) 和 Red ball (レッドボール) 兩種。播種後發生立枯現象，可先用「賜保根」四百倍拌種消毒後下種。播種穴施用未熟堆肥也容易引起立枯病，所以應用腐熟堆肥或利用胡瓜後作栽培。(王進生)



形情落起格價藍甘菜白球結茄番場市央中