



你想栽培那一種鳳梨？

黃榮瑞

本省鳳梨品種，普通可分為外來種、本地種和雜交種等三大類，現將各品種的特性說明如下，以供果農們選擇的參考。

外來種

外來種鳳梨（即開英種）於一九一三年由夏威夷引進，經試栽成功後，在一九二二年大量栽培繁殖。

外來種的特徵，為果實比本地種大，果目淺，味道甜，纖維軟，適合製罐，葉部無刺（僅葉尖有少數），肥培管理容易，適於集約栽培。

它的後裔分佈於全省各地，是目前栽培最多的品種。目前公認為開英種後裔的品系有：

正常開英種 正常開英種為目前推廣品種中最優良的品種。具有果實大，圓筒形，不着生瘤目，吸芽發生早等優點。正常開英種的裔芽數較少，所以，栽培面積只佔四、五成左右，目前正由有關機關使用冠芽插葉方法大量繁殖中。

砂羅種 於一九二六年由砂羅引進，來源雖與開英種不同，但仍為開英種後裔之一，兩品種在本省栽培時，外觀上不易區別，但是普通鳳梨抽穗開花的次序是由下而上，每天展開數花，次序整然，小花大部份都可完全張開，而砂羅種則為相反，即開花時小花不張開或不完全張開，三個花瓣撮合一起，永不開放，能開放的很少，開花次序也很混亂，且用人工雜交時，受粉結子率比其他品種為低。砂羅種的裔芽數也很少，所以，栽培面積不到百分之二。

三菱系 本品種是由日商三菱公司大量引進栽培的，所以命名為三菱系。三菱系的繁殖體多（每株裔芽平均六株以上），適合大量栽培繁殖，所以目前栽培分佈最廣，約佔九五成以上。三菱的果實，比上述兩個品種小，且着生瘤目甚多，果實成熟採收時，有的不易採離母株，以致果實下部斷附於果柄上，一時被認為應淘汰之品種。但因目前電石處理調節結實期甚為發達，供作電石處理時，果實不着生瘤目，適合製罐原料，頗為理想。三菱系也是開英種後裔之一。

本地種

本地種是百數十年前由大陸福建和廣東一帶引進的品種，果肉金黃色，香氣高，含維他命丙很多，但因果實比外來種小，果目深，種子深藏腔內，所以，製罐效率和百分比，都比外來種低。果肉纖維粗，酸度較高，也是缺點。

有刺紅皮種

本品種過去在鳳山一帶栽培最多，葉片紅褐色，兩邊有刺。

無刺紅皮種 員林一帶栽培最多，葉片無刺，淡紫濃綠色，果實成熟時果皮紅色。

黃皮種 為本省鳳梨品種中生長最強的品種，分佈於二水一帶和鳳山，葉片黃綠色，兩邊有刺，果皮黃綠色，成熟時變為黃色。

青葉種 是在黃皮種中發現的品種，植株外觀和黃皮種相似，為黃淡綠色，果皮黑紫色，成熟時為紅黃色。

烏皮種 本品種為本地種中生長最弱的一種，葉兩邊有刺，果皮暗綠色，是在有刺紅皮種中發現的品種。（未完，下期續）

綠肥兼 紫雲英 種子

誠實服務

敬請倍舊愛顧

許源發種子行

▲種子生產原始地信用可靠
▲新鮮純潔保證高脚現貨供應
▲樣品說明書備索請慎重比較

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三
電話：樹林一七一號
郵政劃撥儲金五四〇九號

確保豐收請用 (葉面撒布劑)



檢驗局許可查檢字第四〇〇五五號
(成分正確確效果確實)
最新速効綜合植物營養素
混合液體肥料

速果全質價
迅速健全品質
根發育改善
發防止落果
芽盛病害分
早葉防實甜
提枝預結充
提早收

(全省鄉鎮農會農藥行均有售)

技術
臺灣植物營養科學研究所
製 造
臺灣植物營養股份有限公司
彰化縣北斗鎮元市街五四號電話40號