



你想栽培那一種鳳梨？

黃榮瑞

本省鳳梨品種，普通可分為外來種、本地種和雜交種等三大類，現將各品種的特性說明如下，以供果農們選擇的參考。

外來種

外來種鳳梨（即開英種）於一九一三年由夏威夷引進，經試栽成功後，在一九二二年大量栽培繁殖。

外來種的特徵，為果實比本地種大，果目淺，味道甜，纖維軟，適合製罐，葉部無刺（僅葉尖有少數），肥培管理容易，適於集約栽培。

它的後裔分佈於全省各地，是目前栽培最多的品種。目前公認為開英種後裔的品系有：

正常開英種 正常開英種為目前推廣品種中最優良的品種。具有果實大，圓筒形，不着生瘤目，吸芽發生早等優點。正常開英種的裔芽數較少，所以，栽培面積只佔四、五成左右，目前正由有關機關使用冠芽插葉方法大量繁殖中。

開英種不同，但仍為開英種後裔之一，兩品種在本省栽培時，外觀上不易區別，但是普通鳳梨抽穗開花的次序是由下而上，每天展開數花，次序整然，小花大部份都可完全張開，而砂羅種則為相反，即開花時小花不張開或不完全張開，三個花瓣撮合一起，永不開放，能開放的很少，開花次序也很混亂，且用人工雜交時，受粉結子率比其他品種為低。砂羅種的裔芽數也很少，所以，栽培面積不到百分之二。

三菱系 本品種是由日商三菱公司大量引進栽培的，所以命名為三菱系。三菱系的繁殖體多（每株裔芽平均六株以上），適合大量栽培繁殖，所以目前栽培分佈最廣，約佔九五成以上。三菱的果實，比上述兩個品種小，且着生瘤目甚多，果實成熟採收時，有的不易採離母株，以致果實下部斷附於果柄上，一時被認為應淘汰之品種。但因目前電石處理調節結實期甚為發達，供作電石處理時，果實不着生瘤目，適合製罐原料，頗為理想。三菱系也是開英種後裔之一。

突目（浮目仔） 本品種果目突出特別顯著，因此稱為突目。果實比前述三個品種小，但肉豐果多（約有八六成以上）。又因冠芽和果實較多，不適供做製罐原料，本品種也是開英種變異後裔之一。

本地種

本地種是百數十年前由大陸福建和廣東一帶引進的品種，果肉金黃色，香氣高，含維他命丙很多，但因果實比外來種小，果目深，種子深藏腔內，所以，製罐效率和百分比，都比外來種低。果肉纖維粗，酸度較高，也是缺點。

有刺紅皮種 本品種過去在鳳山一帶栽培最多，葉片紅褐色，兩邊有刺。

無刺紅皮種 員林一帶栽培最多，葉片無刺，淡紫濃綠色，果實成熟時果皮紅色。

黃皮種 為本省鳳梨品種中生長最強的品種，分佈於二水一帶和鳳山，葉片黃綠色，兩邊有刺，果皮黃綠色，成熟時變為黃色。

青葉種 是在黃皮種中發現的品種，植株外觀和黃皮種相似，為黃淡綠色，果皮黑紫色，成熟時為紅黃色。

烏皮種 本品種為本地種中生長最弱的一種，葉兩邊有刺，果皮暗綠色，是在有刺紅皮種中發現的品種。（未完，下期續）

綠肥兼 紫雲英 種子

誠實服務

敬請倍舊愛顧

許源發種子行

種子生產原始地信用可靠

新鮮純潔保證高脚現貨供應

樣品說明書備索請慎重比較

臺北縣樹林鎮鎮前街二十七號之三
電話：樹林一七一號
郵政劃撥儲金五四〇九號

確保豐收請用（葉面撒布劑）



檢驗局許可查檢字第四〇〇五五號
（成分正確確效果確實）
最新速効綜合植物營養素
混合液體肥料

速果全質價
迅速健全品質
根發育改善
發防止落果
芽盛病害分
早發病實甜
提枝預結充
提早收

（全省鄉鎮農會農藥行均有售）

技術
臺灣植物營養科學研究所
製 造
臺灣植物營養股份有限公司
彰化縣北斗鎮元市街五四號電話40號