

# 水稻共同栽培恒春調

——鍾葵錦提供

(一)現在農業科學化推廣教育重要喚起農事研究班互相合作切實行

(二)共同栽培的項目品種栽培到收成總是大家來合作省時省工加省錢

(三)共同秧田好管理種子先用鹽水選播種進前過消毒育成勇壯的秧苗

(四)同時呀種同時布大家共同來布田布田着用密植法每甲株數增該多

(五)中耕除草也共同你來施肥我撻草徹底去偽甲去雜認真去做真要緊

(六)共同栽培大家好收成來用發動機效率提高甲省時大家歡喜祝豐收(請收聽「好農村」「農家樂」及區域性農業節目。)



(七)共同栽培來講起全省總總一百處每處十五到廿甲栽培作業都相同

(八)水稻栽培來共同提高生產減成本我做你做大家做水稻產量普遍高

(九)犁田着用耕耨機田下犁深真要緊共同栽培有代耕你那無牛有人耕

(十)共同栽培共同做稻田灌溉用輪流二到五人來負責無驚水稻會晒死

(十一)水稻病蟲真正多應該徹底來防治防治方法照規定大家來做病蟲無

(十二)共同栽培好結尾增加收成大家蝦農村繁榮國家興反共抗俄一定成

## 夏季施用夏油，不致發生藥害



· 傳良張 ·

最近，有不少農友來信詢問夏油在夏季的使用，以及有關施用技術的問題，茲綜合說明如下：

(一)高級夏油在夏季，如果使用得當，並不會發生藥害。

據過去的試驗，使用五種不同產品的高級夏油，濃度高達百分之三，在七月間噴射五至七年生的柑桔，仍未見有藥害或落果現象發生；所用夏油有 Cpc. Ihara Baseoil-s-26 86. Nihon. Shell 等。但為慎重和經濟起見，夏油的使用濃度，無論冬夏，最好不要超過百分之一·二五，尤其在地下水位高或樹勢衰弱時必須注意。

(二)施用夏油，一定要加用馬拉松，以增加殺蟲效力。

因為據試驗，夏油對黑點介壳蟲(介壳蟲中最難防治的一種)的防治，濃度在百分之一時死亡率為百分之六五·四六，濃度百分之二時死亡率為百分之六六·一七，濃度百分之二·五時死亡率也只有百分之八六·一七，而要濃度高達百分之三才能完全防治。但如加用濃度百分之〇·五之馬拉松乳劑於百分之一的夏油中時，黑點介壳蟲的死亡率可高達百分之九八·六三。

(三)初生新芽、開花期和果實幼小時，應停止噴藥。

這時噴藥，可能引起花果凋落或妨礙新芽的生

(四)配藥後應充分攪拌。配藥後應充分攪拌，同時在噴藥時也應經常攪動，以免油浮水面，濃度不均。

(五)噴藥時，應留意噴過的植株，不要重噴以免油度增濃。

(六)在二個月以內不可噴施夏油二次。

(七)噴施夏油前後三星期內，不可噴射石灰硫黃合劑和波爾多液等以免藥害。

(八)注意與其他農藥的混合使用。夏油不要和石灰硫黃合劑，波爾多液、大生、賽文、水銀劑、好速殺、福爾丹、硫黃粉等混合使用。其他藥劑如要混合使用，也應查看「農藥混合表」。

(九)開封後的夏油，不可放置過久，用剩的夏油，應以臘再密封以免變質。

(十)不要採用來路不明的夏油乳劑。

### 謹告各位農友顧客們!!

敝行為業務擴展之需要，自四月二十三日遷移到新店址照常營業，電話亦同時改為二二四四九號，懇請各位顧客們倍奮愛顧光臨指教是禱。

## 富農種苗行謹啓

新店址

高雄市林森一路一五〇號

電話：二二四四九

郵點高字四〇七一四號

富農種苗行專營各國優良蔬菜、花卉、果樹種苗、農藥，農具應有盡有。

富農園藝吉報附郵二元  
即寄