

水稻共同栽培恒春調

——鍾癸錦提供

- (一) 現在農業科學化推廣教育真重要，喚起農事研究班，互相合作切實行。
- (二) 共同栽培的項目品種栽培到收成，總是大家來合作，省時省工加省錢。
- (三) 共同秧田好管理，種子先用鹽水選，播種進前過消毒，育成勇壯的秧苗。
- (四) 同時呀種同時布，大家共同來布田，布田着用密植法，每甲株數增該多。
- (五) 水稻病蟲真正多，應該徹底來防治，防治方法照規定，大家來做病蟲無。
- (六) 中耕除草也共同，你來施肥我搓草，徹底去僞甲去雜，認真去做真要緊。
- (七) 共同栽培大家好，收成來用發動機，效率提高甲省時，大家歡喜祝豐收。
- (八) 反抗俄一定成，「農家樂」及區域性農業節目。)



來信詢問夏油在夏季的使用，以及有關施用技術的問題，茲綜合說明如下：

(一) 高級夏油，在夏季，如果使用得當，並不會發生藥害。

據過去的試驗，使用五種不同產品的高級夏油，濃度高達百分之三，在七月間噴射五至七年生的樹木，仍未見有藥害或落果現象發生；所用夏油有 Cpc, Ihara, Baseoil-s-26, 86, Nihon, Shell 等。但為慎重和經濟起見，夏油的使用濃度，無論冬夏，最好不要超過百分之一・二五，尤其在地下水位高或樹勢衰弱時必須注意。

(二) 施用夏油，一定要加用馬拉松，以增加殺蟲效力。


因為據試驗，夏油對黑點介壳蟲（介壳蟲中最難防治的一種）的防治，濃度在百分之一時死亡率為百分之六五・四六，濃度百分之二時死亡率為百分之六六・一七，濃度百分之二・五時死亡率也只百分之八六・一七，而要濃度高達百分之三才能完全防治。但如加用濃度百分之〇・五之馬拉松乳劑於百分之一的夏油中時，黑點介壳蟲的死亡率可高達百分之九八・六三。

長。這時噴藥，可能引起花果凋落或妨礙新芽的生長。

(三) 初生新芽、開花期和果實幼小時，應停止噴藥。

夏油用施季夏害藥生發致不

· 傳良張 ·



最近，有不少農友來信詢問夏油在夏季的使用，以及有關施用技術的問題，茲綜合說明如下：

(一) 高級夏油

在夏季，如果使用得當，並不會發生藥害。

據過去的試驗，使

用五種不同產品的高

級夏油，濃度高達百分

之三，在七月間噴射五

至七年生的樹木，仍未

見有藥害或落果現象發

生；所用夏油有 Cpc,

Ihara, Baseoil-s-26,

86, Nihon, Shell 等

。但為慎重和經濟起見

，夏油的使用濃度，無

論冬夏，最好不要超過

百分之一・二五，尤其

在地下水位高或樹勢衰

弱時必須注意。

謹告各位農友顧客們！！

敝行為業務擴展之需要，自四月二十三日遷移到新店址照常營業，電話亦同時改為二二四四九號，懇請各位顧客們倍舊愛顧光臨指教是禱。

愛顧光臨指教是禱。

富農種苗行專營各國

新店址

高雄市林森一路一五〇號

電話：二二一四四九

郵劃高字四〇七一四號

富農園藝吉

報附郵二元

價目表函索

即寄

動，以免油浮水面，濃度不勻。

(五) 噴藥時，應留意噴過的植株，不

要重噴以免油度增濃。

(六) 在二個月以內不可噴施夏油二次。

(七) 噴施夏油前後三星期內，不可噴射石灰硫黃合劑和波爾多液等以免藥害。

(八) 注意與其他農藥的混合使用。

夏油不要和石灰硫黃合劑，波爾多液、大生、賽文、水銀劑、好速殺、福爾丹、硫黃粉等混合使用。其他藥劑如要混合使用，也應查看「農藥混合表」。

(九) 開封後的夏油，不可放置過久，用剩的夏油，應以臘再密封以免變質。

(十) 不要採用來路不明的夏油乳劑。

(四) 配藥後應充分攪拌。

配藥後應充分攪拌，同時在噴藥時也應經常攪