

臺灣全省獨家總經銷

53年7月1日起 全省供應!!

高超的技術!
獨特的包裝!



英國植物保護有限公司
英商卜內門洋碱公司
元山化學工業公司
攜手合作
榮譽出品

「福施芬」五十號殺蟲劑

英國植物保護有限公司

『福施芬』五十號係有機磷殺蟲劑，含有「巴拿芬」50%（重基計）易混和于水中。

『福施芬』五十號適用於果樹、及各種樹木、花卉及蔬菜，有極大之殺蟲效力。

與其他藥劑之混合應用

『福施芬』五十號可與多種藥劑混合應用，但與「普林諾斯」銅劑，「波爾多液」及其他鹼性藥劑混合時，必須在混合後一小時內使用，與「收豐力」石灰硫黃劑合用時，「收豐力」之量不可超過2.5%。

用法及用量

- ① 普通使用：對蚜蟲類、蜘蛛類、食心蟲、薊馬類等害蟲，取濃液10-30公撮開水100公升，對粉介壳蟲為50公撮開水100公升。
 - ② 防治介壳蟲類：應在介壳蟲生長旺盛期噴射。
軟壳介壳蟲類：30公撮開水100公升。
硬壳介壳蟲類：80-160公撮開水100公升。
- 茲將『福施芬』五十號防治蟲害表列于下：

作物	蟲害	用量公撮	作物	蟲害	用量公撮	
脫落性葉類	蚜蟲 綿蚜蟲	10	香蕉	粉介壳蟲類	50	
	蜘蛛 食心蟲			紅蜘蛛類	10	
	紅蜘蛛 梨園介壳蟲	15 30		蚜	30	
柑橘類	硬壳介壳蟲	80-160	菊花	線蟲	50 (浸插枝用)	
	軟壳介壳蟲			30	可可樹	綿蚜蟲
	綿蚜蟲 粉蚜		15			桃樹
橡樹(幼株)	薊馬 葉蝻	5	煙草	青蚜蟲	20	
	小紅蜘蛛				葡萄	綿蚜蟲
甜菜及菜	潛葉蟲 蚜蟲	30	粉介壳蟲	浮塵子		10
						30
蕃茄	線蟲	80 每平方米突 施用5.4公升	水稻	二化螟 三化螟	50	

注意：①食用植物收割前一月內不能噴射。②勿令藥液沾身。③勿內服。④噴射時須穿保護衣服。⑤對有臘質保護之樹葉，害蟲，可加入「阿格隆」LN以增展佈作用。⑥避免噴于嫩葉上。⑦勿隨便亂用。

總代理：英商卜內門洋碱股份有限公司 臺北市中正路一八〇〇號

經銷處：元山化學工業股份有限公司 臺南市復興路十巷四十二號

元山公司所培植少年歌手「顧維的少年家」黃健平，今年16歲，他是參加元山公司舉辦第一屆南臺灣歌唱比賽優勝被發掘。唱片已出版應市，頗為暢銷。黃健平現在服務於元山公司企劃課。（信箱：臺南市169號）。



元山公司
（顧維的少年家——黃健平）