


要重·最·溫·保·火·雞·雛·育·



育雛八星期

火雞育雛，有四種方法：

一、用育雛器或育雛室飼養六至十二星期，通常在八個星期後，可遷移到牧草場去飼養。二、先用電溫育雛約十至廿一天，普通以不過十四天為宜，然後在平地育雛，六個星期後移到草地飼養。三、電溫飼養六至八星期，然後關飼。四、在育雛室平地飼養七至八星期，然後關飼。

所謂關飼，就是緊接育雛以後關在鶯舍內飼養，優點是能保持相當的室溫，足夠活動的空間，和通風良好的環境，又可避免氣候變壞和一切自然界的侵害。消毒防疫和驅除寄生蟲也比較方便。

屋頂不傳熱

一般平地育雛室的條件是：必須能保持乾燥溫暖，光線充分，通風良好，無蟲、鼠、寄生蟲的為害，牆壁不透水，屋頂不傳冷熱，室內溫度保持不受外界氣溫的影響。

假如架設鐵絲網平板代替飼養平地，那末飼料槽、水槽都應放置在鐵絲網上，不必另外再為它裝設鐵絲網，至於窗戶的大小要和地面的空間能相稱，普通一平方英尺的窗子須有十平方英尺的平地。

育雛室的空地約為十英尺×十二英尺，或九英尺×十四英尺，這種大小的育雛室，可以飼養二百五十隻火雞雛，從出生至八星期，週圍並須預留同樣大小的戶外運動場。

至於室內溫度的維持，可以靠電源來控制，如果是掛式的熱源中心在一英寸的平地上，它的溫度是華氏九十五度，適於飼養黑羽毛的小火雞，若是白羽毛的小火雞，便要維持華氏一百度。如利用傘狀育雛器的，離開地面二至三英寸的中心處，黑色和其他深色的小火雞，需要華氏九十五至一百度，但白色小火雞需要華氏一百至一百另五度。至於在室外的室內溫度，大約須保持華氏七十至七十五度或稍高。但仍舊要保持通風的良好。


太熱了喘氣

冷了就會叫

的健康，小火雞開始張口喘氣，無精打采，不再鳴叫，不再合羣。假如育雛室的熱度不足，小火雞就會羣集，啾啾唧唧的哀鳴不斷，並且不願飲食。

風颶未到先準備


劉興欽



，機音收聽，請報警，字紅寫白，汽燈相連，萬千自顧。



近科象來學走，到未急風雨，未急風雨，未急風雨。



期防風，月農水事務處，意，已備自萬。

夜晚，育雛室內溫度易起變化。應避免火雞雛過份的擁擠，並可裝置七支光的電燈，避免火雞發生驚恐、擁擠而且知道採食。

小火雞逐漸長大了，所需溫度要相反的逐漸降低。在氣溫變化情況下，更須靠電源來調節，才能使室內溫度保持不變，直到火雞長大不再用育雛器為止。

原料經精選洗滌後放入水槽內浸漬一晝夜。此時大麥含水量約達百分之五十，放在攝氏廿至卅度下經五至六天便開始發芽。

當幼根生長約達麥粒的二至三倍，麥芽生長達麥粒的一倍半時停止發芽，可製麥芽糖。

至七十度時加入麥芽，分成二、三次混合。糖化溫度在攝氏五十至六十度經七、八小時糖化完成。

澆粉質原料經加熱溶解糖化，在攝氏六十七度在攝氏五十至六十度經七、八小時糖化完成。

此時已生成甜味的泥狀麥芽糖溶液。糖化的完全與否可用碘液測定它的反應，如加碘液後呈青色或紫色時，表示糖化尚未完全。最後把糖化液加熱濃縮並注意焦化着色便得。

朱仙和

小小火雞變成麥芽糖

麥芽糖是澆粉質原料加麥芽，使澆粉糖化而得的。

澆粉原料一般用的

是樹薯，

麥芽則採用小粒大麥的比較好。

小小火雞

鋪墊草

照顧火雞雛，要比普通

的養鷄育雛困難得多，

但是經過了這一個階段，

以後便好多了。這裏先提

出三個要點，提醒你的注

意。

在火雞育雛起初的一兩個星期，用粗砂，泥炭乾水苔，碾碎的乾玉米穗，都可以混合後舖在育雛室的地面上。普通以一英寸篩孔的篩分開，粗的舖在最下層，細的舖在最上層。等到一兩個星期後，可改舖清潔的麥桿、木屑、壓碎的玉米穗、花生壳，壓榨後的甘蔗桿渣，和玉米桿渣或泥炭乾水苔，再加上砂和粗砂，大約舖成四英寸厚，砂層的厚度是半英寸，每星期須加一次，此外亦有用大麥桿、燕麥桿和稻草的，如在適當時期內發現舖墊濕度過高，則可加入石灰。

如用鐵絲網平板代替地板的，似乎較為衛生，但也並非能夠保證毫無疾病。在育雛

換平板

給雛火雞晒太陽，可以增進健康，作為放牧的準備。普通在育雛室外，特設有日晒走廊，和飼舍相連，走廊上舖設鐵絲網平板，四週圍以鐵絲網以免雞隻飛出。育雛室的門口也用鐵絲網隔起來，阻止火雞退回育雛室，同時也要特別小心注意，不要讓雛火雞在走廊上晒太陽時擠在一起。

火雞育雛較其他的鷄困難，難

火雞採食緩慢，又易驚擾，喜互相擁擠堆聚，對於取食和環境的選擇亦極不敏感，所以平時要供應充分的食料

和飲水，氣候變化時要設法避免受凍

，才能使育雛成功。(屏)

多多照料

晒太陽

開始時用廿一號鐵絲，做成○·四英寸見方的孔眼，很合適於雛火雞棲息在粗鐵絲網上。但對於較大的火雞，改用一英寸見方的孔眼，十六號鐵絲編網，較為實用，假使四週齡的火雞，所站的鐵絲網平板孔眼，如小於四分之三英寸時，糞便就不易落下，增加清掃的困難。

給雛火雞晒太陽，可以增進健康，作為放牧的準備。普通在育雛室外，特設有日晒走廊，和飼舍相連，走廊上舖設鐵絲網平板，四週圍以鐵絲網以免雞隻飛出。育雛室的門口也用鐵絲網隔起來，阻止火雞退回育雛室，同時也要特別小心注意，不要讓雛火雞在走廊上晒太陽時擠在一起。

火雞育雛較其他的鷄困難，難


火雞採食緩慢，又易驚擾，喜互相擁

擠堆聚，對於取食和環境的選擇亦極

不敏感，所以平時要供應充分的食料

和飲水，氣候變化時要設法避免受凍

，才能使育雛成功。(屏)



水渠溝水留，
土好無那去流。
石大（剩）春只後雨，
水排留定部金。



水渠溝水留，
土好無那去流。
石大（剩）春只後雨，
水排留定部金。



食居地低，
水渠溝水留，
土好無那去流。
石大（剩）春只後雨，
水排留定部金。