夜晚，育雛室內溫度易起變化。應避免火鷄雛過份的擁擠，並可裝置七支光的電燈，避免雛鷄發生驚恐、擁擠而且知道採食。

小火鷄逐漸長大了，所需溫度要相反的逐漸降低。在氣溫變化情況下，更須靠電源來調節，才能使室內溫度保持不變，直到火鷄長大不再用育雛器爲止。

＊　＊　＊

澱粉加麥芽變成麥芽糖

麥芽糖是澱粉質原料加麥芽，使澱粉糖化而得的。澱粉原料一般用的是樹薯，麥芽則採用小粒大麥的比較好。

原料經精選洗滌後放入水槽內浸漬一晝夜。此時大麥含水量約達百分之五十，放在攝氏廿至卅度下經五至六天便開始發芽。

當幼根生長約達麥粒的二至三倍，麥芽生長達麥粒的一倍半時停止發芽，可製麥芽糖。

澱粉質原料經加熱溶解糖化，在攝氏六十至七十度時加入麥芽，分成二、三次混合。糖化期間攪拌二、三次，促進糖化作用。糖化溫度在攝氏五十至六十度經七、八小時糖化完成，此時已生成甜味的泥狀麥芽糖溶液。糖化的完全與否可用碘液測定它的反應，如加碘液後呈青色或紫色時，表示糖化尚未完全。最後把糖化液加熱濃縮並注意焦化着色便得。朱仙和

小小火鷄

照顧火鷄雛，要比普通的養鷄育雛困難得多，但是經過了這一個階段，以後便好多了。這裏先提出三個要點，提醒你的注意。

舖墊草

在火鷄育雛起初的一兩個星期，用粗砂，泥炭乾水苔，碾碎的乾玉米穗，都可以混合後舖在育雛室的地上。普通以一英寸篩孔的篩分開，粗的舖在最下層，細的舖在最上層。等到一兩個星期後，可改舖清潔的麥桿、木屑、壓碎的玉米穗、花生殼，壓榨後的甘蔗桿渣，和玉米桿渣或泥炭乾水苔，再加以砂和粗砂，大約舖成四英寸厚，砂層的厚度是半英寸，每星期須加一次，此外亦有用大麥桿、燕麥桿和稻草的，如在適當時期內，發現舖墊濕度過高，則可加入石灰。

換平板

如用鐵絲網平板代替地板的，似乎較爲衛生，但也並非能够保證毫無疾病。在育雛開始時用廿一號鐵絲，做成〇·四英寸見方的孔眼，很合適於雛火鷄棲息在粗鐵絲網上。但對於較大的火鷄，改用一英寸見方的孔眼，十六號鐵絲編網，較爲實用，假使四週齡的火鷄，所站的鐵絲網平板孔眼，如小於四分之三英寸時，糞便就不易落下，增加清掃的困難。

晒太陽

給雛火鷄晒太陽，可以增進健康，作爲放牧的準備。普通在育雛室外面，特設有日晒走廊，和鷄舍相連，走廊上舖設鐵絲網平板，四週圍以鐵絲網以免鷄隻飛出。育雛室的門口也用鐵絲網隔起來，阻止火鷄退回育雛室，同時也要特別小心注意，不要讓雛火鷄在走廊上晒太陽時擠在一起。

火鷄育雛較養其他的鷄困難，雛火鷄採食緩慢，又易驚擾，喜互相擁擠堆聚，對於取食和環境的選擇亦極不敏感，所以平時要供應充分的食料和飲水，氣候變化時要設法避免受凍，總之，火鷄的育雛設備要特別良好，才能使育雛成功。（屏）

多多照料

備準愛水飲食糧，
起釘先門窗頂屋，
離搬先民居地低，
去地無時到通嗎！

平時樹草愛水山，
災成變（會不才）責者水溝水防堤，
害無那風心驚免嗎！
衆衆愛草樹時平，
我衆



坡地排水重要，
水一溝一着定愛留，
那無土好攏（部金）森只後雨，
去流（剩）大石頭！