


農友經驗

種文竹要注意排水

我當初開始栽種文竹時，是把文竹不分大小分株來種，用園土五份放在花盆的最上層，水田土和腐葉各五份混合後放在下層，結果生長不好，所生幼芽都很細小，而且盆裏常積滯大量的水份。

後來我改變了種植的方法，把文竹選擇健全的幼芽，每兩、三株在一起，改用腐葉做成的培養土五份和園土四份，另加一份砂充分混合後栽植，結果發育非常旺盛，株條很健壯，文竹的姿態變得優美細緻，看來引人入深。(雲林縣西螺鎮文昌路二五號林宏)



林宏

防治二化螟蟲要適時

我家今年第一期水稻在雨季前插秧，三月上旬首次除草時，發現二化螟蟲第一代開始在田間產卵孵化，按照本刊指示，用百分之三 r B H C 粉劑全面撒佈，每分地施四公斤，田水保持三分公的水深。

經過三、四天後，漸見以前稻株萎黃，葉鞘黃色部份重又回青，這時我確實深信防治二化螟蟲，一定要在稻株未枯心前噴藥才有效。因為二化螟蟲發生時期有四次，三月發生一世代，五月發生二世代，六月發生三世代，十月發生四世代。防治工作一定

要配合時期。另有四點必須注意：一、樹蔭下或水稻特別茂盛的區域，為害較嚴重，所以要注意砍伐徒長的樹枝，使陽光充足。二、多施鉀肥。三、努力刈除畦畔雜草。四、要到農會去買可靠的農藥。(臺中市北屯區松竹里昌平路二段四號林清溪)

荔枝壓條效率高

我家種二甲地荔枝，是五年前用玻璃布空中壓條的成果。荔枝壓條的氣候要溫暖，普通在四月中下旬為宜。

壓條前，先把材料配好，土壤以粘土為宜，約全量的二分之一，再加堆肥和木屑各四分之一，因為木屑可使培養基鬆軟，根容易發育。如此一面調和，一面加水，調到含水率約百分之六十。然後選定無病蟲害的枝條，離分枝點十公分部位，用利刀行環狀剝皮，寬約一至二公分。剝皮後把培養土捏成團，放在玻璃布上，包在枝條四周，用細鉛絲把兩端縛緊。在縛緊時要注意鉛絲和枝條間，應含有培養土，可使通風且有透水的的作用，如此可使培養土保持一定的濕度，容易發根而且更促進根的發育，這可認為是壓條的一項秘訣。

如此所壓枝條，發根快且多，約二至三月便可栽植，據我經驗，發根率可達百分之九十。

(彰化縣員林鎮林厝里泉州巷廿八號陳榮雄友)



陳榮雄友



樂農家

請認明拜耳商標為品質 高超之標記

現貨供應

興農化工股份有限公司

地址：臺中縣大里鄉內新路五十九號
電話：二六一九·四六八八

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號
電話：三八八二六

臺灣總代理

中德貿易有限公司農藥部

地址：臺北市博愛路九十八號
電話：三三一五七
三三一五八
三三一五九



防治

果樹·蔬菜

小麥·菸葉

等各種病害