



### 水稻臺南三號適宜蘭區

【問】：一、宜蘭地區以何品種產量最高？

- 二、適宜的行株距多少寸？插幾枝？
- 三、水稻使用荷爾蒙劑可增產嗎？
- 四、宜蘭地區第一期作氮肥施用量約需多少？（宜蘭縣冬山鄉太和村七十五號游福安）

【答】：一、宜蘭地區水稻品種以臺南三號產量最高。

### 斤。（王進生）

### 【臺大高雄五號】豆種比「十石」小

【問】：臺大高雄五號大豆種子和十石豆子的比較如何？（臺中縣外埔鄉三坂村三坂路四十號劉繼麟）

【答】：臺大高雄五號種子比十石稍為小一點。種皮淡黃色，有點像十石，但不像青皮豆。植株也比十石高，植株上的茸毛是褐色，花是白色，而十石植株上的茸毛是白

二、株行距廿二·五×廿二·五公分或三十×十五公分，第一期祇要插三株，第二期插五株為宜。

三、據試驗結果水稻用植物荷爾蒙，僅能增收百分之三至四，成本化不來。

四、在宜蘭第一期作每公頃施用尿素二百二十公斤，分三次施用，硫酸銨每公頃四百五十公

色，花是紫色。（劉文慶）

### 推廣中的陸稻新品種

【問】：陸稻有較好的品種嗎？「大連種」，是在來種？據說易患稻熱病可試種嗎？（屏東縣高樹鄉寮寮村新改路三號賴壽安）

【答】：一、推廣中的陸稻新品種，耐旱又豐產的，有農早一號、臺南二號、東陸二號，可向臺北農業試驗所，臺南區農業改良場，臺東區農業改良場接洽試種。

二、大連種是在來種水稻，產量不高，並非推廣種，既然容易患稻熱病，更不應該試種，如欲栽種在來種，可就近請教高雄區農業改良場介紹適應的優良品種。（楊方平）

### 當歸用硫磺燻可殺蟲

【問】：一、當歸為何會發生蛀蟲？如何撲滅？  
二、當歸如何使用硫磺燻燻？（林家萬）

【答】：一、貯藏當歸應用密閉方式，否則易受空氣濕度，發生蛀蟲。  
二、硫磺燻燻方法，可用木箱一隻，分隔上下兩半，上半裝當歸，下半燒硫磺，把木箱密封，四至八小時可啓封。或向各地中藥店借用即可。（秦毅夫）

### 蔗園施綠肥磷鉀不可缺

【問】：蔗園間作大豆作綠肥，還需補充過磷酸鈣和氯化鉀嗎？（雲林縣水林鄉水林路八十九號林崑少）

【答】：一、大豆作綠肥的含氮量約千分之三。肥效約當化學肥料的一半，即施一千公斤綠肥時，應減施化學氮素十五公斤。

二、綠肥所含磷、鉀取自土壤，不應減施，蔗園仍須照普通量，每公頃施磷素肥料七十五公斤，鉀質肥料一百五十公斤。（伍文權）




日產 化學

# PIN

## 必 愛 用

300cc × 30



水稻：二三化螟蟲。

果樹：紅蜘蛛，吃蕊蟲，捲葉蟲。

棉花：金鋼鑽，紅鈴蟲，蚜蟲。

豆類：金龜子，豆天蛾，潛蠅。

蔬菜：蚜蟲，夜盜蟲，菜蝗，壁蝨，象鼻蟲，青蟲。

### 銅水和劑 (強力殺菌劑) 500g × 40 × 2

蔬菜，瓜類，馬鈴薯，蕃茄各種病害特效藥

### 飛佈達粉劑 3kg × 8包

最新強力土壤殺蟲劑

### 水銀波爾多 500g × 40 × 2

柑桔，黑點病，瘡痂病，潰瘍病，對瓜類豆類各種病害

### 殺爾頓90 500g × 40 × 2

防治：蔬菜，瓜類，白粉病及果樹蜘蛛，着色促進。

### 進口原裝現貨供應

## 荷蒙綠

ホモグリーン 500g × 40 1kg × 20

中日技術合作植物生長促進劑

### 日星實業股份有限公司

臺北市南京西路五號之一  
電話：40550 • 40660