



水稻臺南三號適宜蘭區

【問】：一、宜蘭地區以何品種產量最高？

- 二、適宜的行株距多少寸？插幾枝？
- 三、水稻使用荷爾蒙劑可增產嗎？
- 四、宜蘭地區第一期作氮肥施用量約需多少？（宜蘭縣冬山鄉太和村七十五號游福安）

【答】：一、宜蘭地區水稻品種以臺南三號產量最高。

斤。（王進生）

【臺大高雄五號豆種比「十石」小

【問】：臺大高雄五號大豆種子和十石豆子的比較如何？（臺中縣外埔鄉三坂村三坂路四十號劉繼麟）

【答】：臺大高雄五號種子比十石稍為小一點。種皮淡黃色，有點像十石，但不像青皮豆。植株也比十石高，植株上的茸毛是褐色，花是白色，而十石植株上的茸毛是白

二、株行距廿二·五×廿二·五公分或三十×十五公分，第一期祇要插三株，第二期插五株為宜。

三、據試驗結果水稻用植物荷爾蒙，僅能增收百分之三至四，成本化不來。

四、在宜蘭第一期作每公頃施用尿素二百二十公斤，分三次施用，硫酸銨每公頃四百五十公

色，花是紫色。（劉文慶）

推廣中的陸稻新品種

【問】：陸稻有較好的品種嗎？「大連種」，是在來種？據說易患稻熱病可試種嗎？（屏東縣高樹鄉寮寮村新改路三號賴壽安）

【答】：一、推廣中的陸稻新品種，耐旱又豐產的，有農早一號、臺南二號、東陸二號，可向臺北農業試驗所，臺南區農業改良場，臺東區農業改良場接洽試種。

二、大連種是在來種水稻，產量不高，並非推廣種，既然容易患稻熱病，更不應該試種，如欲栽種在來種，可就近請教高雄區農業改良場介紹適應的優良品種。（楊方平）

當歸用硫磺燻可殺蟲

【問】：一、當歸為何會發生蛀蟲？如何撲滅？二、當歸如何使用硫磺燻燻？（林家萬）

【答】：一、貯藏當歸應用密閉方式，否則易受空氣濕度，發生蛀蟲。

二、硫磺燻蒸方法，可用木箱一隻，分隔上下兩半，上半裝當歸，下半燒硫磺，把木箱密封，四至八小時可啟封。或向各地中藥店借用即可。（秦毅夫）

蔗園施綠肥磷鉀不可缺

【問】：蔗園間作大豆作綠肥，還需補充過磷酸鈣和氯化鉀嗎？（雲林縣水林鄉水林路八十九號林崑少）

【答】：一、大豆作綠肥的含氮量約千分之三。肥效約當化學肥料的一半，即施一千公斤綠肥時，應減施化學氮素十五公斤。

二、綠肥所含磷、鉀取自土壤，不應減施，蔗園仍須照普通量，每公頃施磷素肥料七十五公斤，鉀質肥料一百五十公斤。（伍文權）




日產 化學

PIN

必 愛 用

300cc × 30



水稻：二三化螟蟲。

果樹：紅蜘蛛，吃蕊蟲，捲葉蟲。

棉花：金鋼鑽，紅鈴蟲，蚜蟲。

豆類：金龜子，豆天蛾，潛蠅。

蔬菜：蚜蟲，夜盜蟲，菜蝗，壁蝨，象鼻蟲，青蟲。

銅水和劑 (強力殺菌劑) 500g × 40 × 2

蔬菜，瓜類，馬鈴薯，蕃茄各種病害特效藥

飛佈達粉劑 3kg × 8包

最新強力土壤殺蟲劑

水銀波爾多 500g × 40 × 2

柑桔，黑點病，瘡痂病，潰瘍病，對瓜類豆類各種病害

殺爾頓90 500g × 40 × 2

防治：蔬菜，瓜類，白粉病及果樹蜘蛛，着色促進。

進口原裝現貨供應

荷蒙綠 ホモグリーン 500g × 40 1kg × 20

中日技術合作植物生長促進劑

日星實業股份有限公司

臺北市南京西路五號之一 電話：40550 • 40660



調查肥素

【問】：一、本人買的肥素肥料，發現是用尿素和磷安各半混合的，請問應否取締？

二、市售五十公斤裝的尿素肥料，發現是用尿素和磷安各半混合的，請問應否取締？

三、市售肥素的肥效如何？（臺北縣三峽鎮安坑里六十九號黃希毅）

【答】：一、尿素和氮化銨（鹽安）都是氮素肥料，依規定，任何人不得擅自改裝滲什販賣，否則可報警取締。

二、臺灣公司第六廠生產的尿素有「工業用」和「肥料用」兩種，都在包裝上印有文字說明成分相同，但作肥料用的須經檢驗局作出廠檢驗合格方准出售。

三、所謂「肥素」究係何物，檢驗局正調查中，五大產業公司並未向檢驗局申請肥料製造登記。（檢驗局）

回收硫酸銨和普通的相同

【問】：一、回收硫酸銨和普通硫酸銨一樣嗎？

二、回收肥料用在鳳梨的結果如何？（南投鎮三興里彰南路一百三十三號簡海）

【答】：一、「回收硫酸銨」和普通硫酸銨一樣，祇是前者有時略帶顏色或結晶較細而已。

二、「回收硫酸銨」施用於鳳梨的肥效，應和施用合成品硫酸銨的相同。（臺灣省糧食局肥料運銷處）

粒狀氮化鈣並不經濟

【問】：一、粒狀氮化鈣肥料使用方便，但農民很難買到，是何原因？

二、臺肥今後可改製粒狀氮化鈣嗎？（南投縣名間鄉三光村四十八號陳金田）

【答】：一、粒狀氮化鈣施用雖方便，需增加加工成本。售價一樣，並不經濟，臺肥公司正計劃逐年減低生產。

二、因粒化後氮素損失百分之二，農民無形中損失肥料。肥效不如粉狀。日本每年消費二十餘萬公噸氮化鈣也都使用粉末。（吳石生）

高冷地適於種豆類

【問】：一、東部海拔八、九百公尺處可否種紅豆？何時種？何時收？行株距如何？是否怕山豬損害？

二、現時高冷地可種什麼豆？（臺東縣關山鎮墾里十巷中山路卅三號郭樹）

【答】：一、紅豆易受霜害，故在八、九百公尺山地，宜在五月下旬播種，可分次收穫約一個月，但為節省時間，可當七成熟時一起收。平時要在意山豬會來損害紅豆圃。

二、間拔至株距十五公分，適當的除草如果是蔓性種，可在七月中旬割除蔓的頂端，促使生育和成熟均一。

三、高冷地現在可種花豆、大豆和菜豆。（王進生）

梨喜歡冬季低溫

【問】：一、本人想種梨不知最適宜的土質和海拔多高？

二、梨山所種新世紀、二十世紀、長十郎、巴黎等，是否日本品種？可否用來嫁接橫山梨？（宜蘭市東港路卅二號陳慶興）

【答】：一、日本梨在本省適於一千五百至二千公尺的高度，冬季在華氏四十度以下的低溫積有八百至一千小時的，生長和產量都好。宜砂壤土，但以土層厚，排水好，微酸性的土壤為最好。

二、梨山所種新世紀、二十世紀、長十郎都是日本品種，巴黎是西洋梨系統。可以與橫山梨嫁接。（朱長志）

梨樹生病速即治療

【問】：一、梨樹發生病斑，應用何藥防治？（南投霧社幼獅山莊王天民）

【答】：一、梨枝病病斑的是枝枯病。樹皮枯死裂開的是胴枯病。

二、如已發生，除去病枝燒燬，梨枝較粗部份，可除去病斑後塗抹生油液，即昇求一公分，溶解在七十五立方公分水裏，加入甘油二百五十立方公分或烏斯普龍八百倍稀釋液。

三、粗枝切口或病變後剝除處塗接蠟。

四、注意肥培和管理。撒佈六一二式，或四一八式「過量石灰波爾多液」。（吳福壽）

農藥成份標準 保證品質優良

- 臺北 新達農藥行 臺北市迪化街一段249號 電話46782
- 桃園 豐年農藥行 桃園縣中壢鎮民權路35號 電話321
- 新竹 新竹青果運銷合作社 新竹西大路105號 電話1425
- 苗栗 惠農行 苗栗縣竹南鎮八德街45號
- 南投 泰生保壽堂 南投縣南投鎮鎮民路113號 電話22轉
- 臺中 鴻豐行 臺中市向上路一段2號之5 電話6227
- 生光農藥行 臺中市興中街13號 電話4884
- 彰化 英豐行 臺中縣霧峰鄉中正路327號 電話68轉
- 德榮行 彰化市民生路166號 電話401
- 雲林 惠農行 雲林縣虎尾鎮光復路45號之1 電話363
- 嘉義 年豐農藥行 嘉義縣新港鄉六桂村三鄰199號 電話24
- 臺南 蓬萊農藥賣材行 臺南市公民路178號 電話3497轉
- 高雄澎湖 富農種苗行 高雄市林森一路150號 電話22449
- 花蓮臺東 邱協成農藥行 花蓮中正路8號 電話990轉




巴拉松乳劑
P M 乳劑
馬拉松乳劑
安特靈乳劑
地特靈乳劑
DDT 乳劑
魚藤精乳劑
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

現貨供應



常吃皮蛋無害

【問】：一、我們經常吃的皮蛋是用氫氧化鈉製造的會有害嗎？

二、十多斤的小豬能注射乾燥氯化疫苗嗎？注射後約十多天發生豬瘟症狀，是否和注射有關？(彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路八十四號徐朝陽)

【答】：一、皮蛋是利用氫氧化鈉製造，但含量很微，常吃無害。且因其略帶鹼性，還有助於消化。

二、小豬十多斤，可以注射氯化豬瘟疫苗的，注射後可能會發生豬瘟，但很少。發生了可用豬瘟血清注射治療。(李登元)

蜜蜂痲痺病要換新王

【問】：一、蜜蜂死亡前，在巢框上面爬走，搖搖擺擺，身上和腹部都發出好似油脂透過的光亮，飛不起來，不知是什麼病？

二、這種痲痺現象，是否農藥有影響？

三、巢片和木箱，是否須要消毒？(臺東鎮福建路一三八號李子玉)

【答】：一、所稱現象，可能患蜜蜂痲痺病，如能更換已交尾產卵而較有抵抗力的新王，或可恢復羣勢，不可換入未交尾的處女王。

毛皮和皮革的鞣製

【問】：毛皮和皮革的鞣製法有何不同？(花蓮縣秀林鄉水源村一百一十四號李伯海)

【答】：一、毛皮鞣製法和普通的皮革鞣製有點不同，因為毛皮的鞣製是要保存毛，不使脫毛。至於使用「糊樹單寧」，就是一種自樹樹提煉出來的單寧酸，這種方法都用在皮革即牛皮的鞣製，毛皮很少使用單寧酸鞣製，最簡單的方法是用明礬或酪酸鉀等。(黃立羣)

梅梨適於山地但北面不好

【問】：一、臺中縣三、五百公尺山地的北面山脚適於種梅嗎？

二、梅的優良品種，應向何處購買？栽植四畝尺高的嫁接梅苗，幾年後可收？

三、梅和梨的株行距多少為宜？(雲林縣虎尾鎮虎尾蔗作改良場黃晉勝)

【答】：一、臺中區三、五百公尺的山地可種梅和梨，但北面山脚亦都不適宜，因陽光少過於陰濕，易使梅生長盛而結果少。

二、梅的優良品種，可向員林購買大粒種嫁接苗。四畝尺苗種植後，約三年，即五、六年生可以開始結果。

魚乾做雞飼料較為經濟

【問】：一、魚乾可施在桔子上做肥料嗎？

二、如是五年生者每株施若干？春、夏、秋、冬、那最合宜？又可否和氮、磷、鉀混合施用？(臺東縣卑南鄉美濃萬萬十一號呂彥武)

【答】：一、魚乾做肥料很好，但還是用發糞雞飼料，再把雞糞做肥料較為合算。

二、五年生柑樹，每株可施魚乾一公斤，在一月施用做基肥，另加硫酸六六六克，過磷酸鈣五百克，硫酸鉀三百克，分三次，在一、五、八月施用。(邱再發)

母豬不要先檢查

【問】：一、我家有壹頭桃園種母豬，在今年一月廿七日請農會獸醫行人工授精，但到了預產期未見生產。

二、後來又共注射了五回還是沒有生，請問原因何在？(臺南縣仁德鄉新田村二十七號梁金帶)

【答】：一、先檢查人工授精後是否確已懷孕？就是肚子大不大？有無末期胎動的現象？分娩前有無應該泌乳的現象？否則可能是根本沒有授精！

二、如有前述現象是死胎。亦會娩出，但可能時間拖久些。(張聯欣)

品質優良 定價低廉 如蒙賜顧 無任歡迎

本公司 BHC 粉劑供應站及連絡處：

- 高雄土地銀行內 電話 2333 號
- 臺南縣農會 電話 2333 號
- 嘉義土地銀行內 電話 2333 號
- 雲林縣西螺鎮中興里 電話 2333 號
- 彰化中正路 2333 號 源裕行 電話 2333 號
- 新竹東門市場內 三信行 電話 2333 號
- 花蓮豐田本公司礦場 電話 2333 號
- 臺北市迪化街 1 段 2333 號 許先印 電話 2333 號
- 桃園中正路 133 號 劉金治 電話 2333 號
- 農友行 電話 2333 號
- 宜蘭縣農會 電話 2333 號

總公司：
臺北市許昌街十二號
電話：二二一三八號
三二五九八號

加工廠：
南港鎮南港路二段 59 號
電話：39807 號

靈丹粉 6.5%r BHC 水懸粉 劑

青蛙牌

B. H. C. Dist.
中國石礦股份有限公司

謹告各位農友顧客們！！

敝行爲業務擴展之需要，自四月二十三日遷移到新店址照常營業，電話亦同時改爲二二四四九號，懇請各位顧客們倍舊愛顧光臨指教是禱。

富農種苗行專營各國優良蔬菜、花卉、果樹種苗、農藥，農具應有盡有。

富農園藝吉報附郵二元價目表函索即寄

富農種苗行謹啓

新店址：高雄市林森一路一五〇號
電話：二二四四九
郵劃高字四〇七一四號

註冊商標：中臺字11648號



植物生長促進細胞賦活劑
世界聞名最新特效農藥



液劑

增收的原動力
提早收穫
改善品質
防止病蟲害



品質保證
價格低廉

製造：日本旭化學工業株式會社
總代理：臺實貿易股份有限公司
臺北市太原路44號 電話：45437 41119

農友們!! 增加你的收益

▲紫色瑞典蕪菁
▲興農黃肉飼料蘿蔔4038號
▲蘆筍美麗華威頓 八月中可入貨

(美國原封罐裝) 歡迎預約訂購

敝行贈送與農初夏一號甘藍·興農三季甘藍種子來郵
二元郵券

一九六四年興農園藝新知識 來函付郵二元郵券

輸入元 林興農行股份有限公司

興農種子行

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
電話：九七二六三四
劃撥帳號四〇二八號

連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

最新廣効性殺蟲劑 (農林廳登記證 農藥字第61號)

固殺松乳劑 保證原裝!
(Gusathion E C) 現貨供應

能殺：水稻二、三化螟蟲，稻粘，棉花，鳳梨，大豆，蔬菜以及各種果樹之一切害蟲，且對巴拉松，富粒多已生抗性之害蟲亦具有著效。

日本三共製藥株式會社出品保證原裝!

タカ水銀ボルドウ 水銀ボルドウ
リオゲン錠 トクエース(藥効增強劑)
新グラミン展着劑 ヘプタ粉劑

臺灣經銷：臺灣南興泰貿易有限公司
臺中市市府路116號 TEL: 4542

現貨供應

北部區：大信農產行 臺北市迪化街一段221號
榮華種子行 三重市重新路一段72號
南部區：洽豐農產行 北港鎮大同路84號

養羊吃草為主

【問】：一、養羊需要什麼飼料？牧羊種子到那裏買？
二、我有一隻羊，忽然間肚皮膨脹如鼓，不到一小時即告死亡，請問這是什麼病？
三、剪毛何時為宜？有無廠商收購？

【答】：一、飼羊以草為主，能種牧草最好，牧草種子，可向臺北市鎮江街二號臺灣省農業改進會購買，並可指導你方法。
二、這是急性鼓脹病，當時須投制止酸劑的藥，腹部按摩，設法自食道中排出氣體，或行手術，在左腰部穿孔，太慢了無效。
三、剪羊毛在春秋二季為宜。中水紡織公司收購，價值不一定。(黃立羣)

養鯉魚一年可收

【問】：一、白鯉魚容易飼養嗎？
二、由小養大出售有幾斤？需多少時間？可得利益多少？(洪長祿)

【答】：一、鯉魚很容易飼養。
二、通常從魚苗養成魚要一年，在三

月放養的到年底可收成。至於利益多少要看魚池肥沃情形和市場價格而定。(吳榮藩)

鴨種和管理好可賺錢

【問】：一、養產蛋鴨是否有利？
二、幼鴨時期要注意些什麼？
三、水源地發生傳染病如何防止和治療？(苗栗縣西湖鄉金獅村十九號)


【答】：一、鴨種好，管理好，有利。
二、幼鴨至成鴨的飼養管理和飼料配合和雞一樣，但要特別注意在幼鴨六星期內羽毛未長齊前不要讓它下水，把身體弄濕。否則身體濕易受寒，患軟脚病等死亡。
三、水源有傳染病流行，不宜放鴨，一般傳染病的治療效果都不好。(李登元)

最佳飼料強化劑·最好家畜生長促進劑

家畜用胖維他 Panvita
(パンビタン)

用法

牛：每頭每天 5至10公分。
仔猪：每頭每天 2.5至3公分。
大中豬：每公斤乾糧加入 1至2公分。
鷄鴨：成鷄鴨每公斤飼料加 2.5公分，小鷄鴨3公分。



效能

①促進食欲，加速生長，提高飼料營養價值。
②預防貧血，防治肺炎，下痢及其他疾病。

包裝 2.5公斤·450公分·200公分·100公分

新農行 出品
宜蘭市康樂路114號 電話：403號

說明書備索 微各地經銷商 全省各飼料行均售