



調查肥素

【問】：一、本人買的肥素肥料，發現是用尿素和磷安各半混合的，請問應否取締？

二、市售五十公斤裝的尿素肥料，發現是用尿素和磷安各半混合的，請問應否取締？

三、市售肥素的肥效如何？（臺北縣三峽鎮安坑里六十九號黃希毅）

【答】：一、尿素和氮化銨（鹽安）都是氮素肥料，依規定，任何人不得擅自改裝滲什販賣，否則可報警取締。

二、臺灣公司第六廠生產的尿素有「工業用」和「肥料用」兩種，都在包裝上印有文字說明成分相同，但作肥料用的須經檢驗局作出廠檢驗合格方准出售。

三、所謂「肥素」究係何物，檢驗局正調查中，五大產業公司並未向檢驗局申請肥料製造登記。（檢驗局）

回收硫酸銨和普通的相同

【問】：一、回收硫酸銨和普通硫酸銨一樣嗎？

二、回收肥料用在鳳梨的結果如何？（南投鎮三興里彰南路一百三十三號簡海）

【答】：一、「回收硫酸銨」和普通硫酸銨一樣，祇是前者有時略帶顏色或結晶較細而已。

二、「回收硫酸銨」施用於鳳梨的肥效，應和施用合成品硫酸銨的相同。（臺灣省糧食局肥料運銷處）

粒狀氮化鈣並不經濟

【問】：一、粒狀氮化鈣肥料使用方便，但農民很難買到，是何原因？

二、臺肥今後可改製粒狀氮化鈣嗎？（南投縣名間鄉三光村四十八號陳金田）

【答】：一、粒狀氮化鈣施用雖方便，需增加加工成本。售價一樣，並不經濟，臺肥公司正計劃逐年減低生產。

二、因粒化後氮素損失百分之二，農民無形中損失肥料。肥效不如粉狀。日本每年消費二十餘萬公噸氮化鈣也都使用粉末。（吳石生）

高冷地適於種豆類

【問】：一、東部海拔八、九百公尺處可否種紅豆？何時種？何時收？行株距如何？是否怕山豬損害？

二、現時高冷地可種什麼豆？（臺東縣關山鎮墘里十巷中山路卅三號郭樹）

【答】：一、紅豆易受霜害，故在八、九百公尺山地，宜在五月下旬播種，可分次收穫約一個月，但為節省時間，可當七成熟時一起收。平時要在意山豬會來損害紅豆圃。

二、間拔至株距十五公分，適當的除草如果是蔓性種，可在七月中旬割除蔓的頂端，促使生育和成熟均一。

三、高冷地現在可種花豆、大豆和菜豆。（王進生）

梨喜歡冬季低溫

【問】：一、本人想種梨不知最適宜的土質和海拔多高？

二、梨山所種新世紀、二十世紀、長十郎、巴黎等，是否日本品種？可否用來嫁接橫山梨？（宜蘭市東港路卅二號陳慶興）

【答】：一、日本梨在本省適於一千五百至二千公尺的高度，冬季在華氏四十度以下的低溫積有八百至一千小時的，生長和產量都好。宜砂壤土，但以土層厚，排水好，微酸性的土壤為最好。

二、梨山所種新世紀、二十世紀、長十郎都是日本品種，巴黎是西洋梨系統。可以與橫山梨嫁接。（朱長志）

梨樹生病速即治療

【問】：一、梨樹發生病斑，應用何藥防治？（南投霧社幼獅山莊王天民）

【答】：一、梨枝病斑病的是枝枯病。樹皮枯死裂開的，是胴枯病。

二、如已發生，除去病枝燒燬，梨枝較粗部份，可除去病斑後塗抹生油液，即昇求一公分，溶解在七十五立方公分水裏，加入甘油二百五十立方公分或烏斯普龍八百倍稀釋液。

三、粗枝切口或病變後剝除處塗接蠟。

四、注意肥培和管理。撒佈六一二式，或四一八式「過量石灰波爾多液」。（吳福壽）

農藥成份標準 保證品質優良

- 臺北 新達農產行 臺北市迪化街一段249號 電話46782
- 桃園 豐年農產行 桃園縣中壢鎮民權路35號 電話321
- 新竹 新竹青果運銷合作社 新竹西大路105號 電話1425
- 苗栗 惠農行 苗栗縣竹南鎮八德街45號
- 南投 泰生保壽堂 南投縣南投鎮鎮民路113號 電話22轉
- 臺中 鴻豐行 臺中市向上路一段2號之5 電話6227
- 生光農藥行 臺中市興中街13號 電話4884
- 彰化 英豐行 臺中縣霧峰鄉中正路327號 電話68轉
- 德榮行 彰化市民生路166號 電話401
- 雲林 惠農行 雲林縣虎尾鎮光復路45號之1 電話363
- 嘉義 年豐農藥行 嘉義縣新港鄉六桂村三鄰199號 電話24
- 臺南 蓬萊農藥資材行 臺南市公民路178號 電話3497轉
- 高雄澎湖 富農種苗行 高雄市林森一路150號 電話22449
- 花蓮臺東 邱協成農藥行 花蓮中正路8號 電話990轉



巴拉松乳劑  
P M 乳劑  
馬拉松乳劑  
安特靈乳劑  
地特靈乳劑  
DDT 乳劑  
魚藤精乳劑  
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇  
工廠：台北縣景美鎮中正路三一七號

現貨供應