

仔猪白痢

趙法清

如何預防

仔猪拉下灰白色的臭便，這是白痢病的特徵！對猪隻繁殖，極受威脅。最好從飼養管理上及早預防，一旦發病後，發育變遲緩，患重症的可以致死。

仔猪害病和母猪有關

母猪的飼養管理如果不適當，會使乳質發生種種變化。例如澱粉質飼料和酸性飼料餵得太多，乳汁中的脂肪增多，或者發生酸性乳。如果飼料中的無機質和青料不足，乳汁中便會缺乏鈣的成分，或者豆粕和魚粉餵得過多，乳汁中蛋白質就會增加。另外，如因母猪患有下痢、中毒、乳房炎、或發生猪瘟、傳染胃腸炎、以及猪副傷寒等傳染病等情形，都可以引起猪的白痢病。

在仔猪的飼養管理方面，如果人工乳的調和和給量不合理，或因母猪蛔蟲驅除不徹底，感染了蛔蟲和大腸菌。

猪舍不清潔，敷草沒有勤換，墊草太少，防寒設備不完全，仔猪腹部受寒冷。在仔猪的消化器未完全發達前，仔猪盜吃母猪所吃的飼料。或當仔猪在運動中，青料吃得太多，這些都是引起仔猪本身發生白痢的原因。

病狀易辨別預防要緊

仔猪排有灰白色惡臭的下痢便。這是白痢的特徵。一般仔猪排糞習性，都在猪舍邊角或靠壁，一進入猪舍就可聞到惡臭。有時糞色變

黃色而濃時，是因早期採食青料和吃得太多，盜食母猪飼料所致，糞便混有血液等，可能發生猪瘟或其他猪疫的緣故。

下痢程度，要看糞的形狀而不同，灰白色的固形狀態，病情還輕。重病時，多為水瀉狀。且輕症時糞便污染肛門周圍較少，重症的腰彎曲，頭低下，尾卷曲在兩後肢間，皮膚貧血蒼白，被毛失去光澤，發育不良。

如認為母猪不良時，給與母猪的飼料配合，應加以改善，如把飼料適宜的加水使分泌的乳汁稀薄，使乳汁中的脂肪容易消化，或給與青料等多汁性的飼料，提高母乳的鹼度，都可收改善的效果。

泌乳量特別多時，母猪的給飼量應適宜的減低。

注意猪舍要清潔，乾燥，冬季或雨季時能保溫，夏季空氣須流通，此外，哺乳期母猪常有蛔蟲寄生，需用驅蟲藥實施驅蟲，驅蟲時間，最好在懷孕前施行。

離乳可避免白痢傳染，在適當時期宜使仔猪慣食飼料。

治療法分內服和注射

藥物治療可以補飼養管理的不足，內服藥：給與磺胺類藥，收斂藥，以及整腸藥混合處方，用藥量須經獸醫配合，照規定的用法服用。對病重的仔猪，依據作者近來臨牀的經驗，用臺灣氣胺公司出品的可溶性金黴素（Soluble Aureomycin）每頭用約五十毫克（mg）溶少量水灌服治療，有顯著的效果。


注射藥：病狀嚴重，服藥效果不大，或乳猪成長較大給藥困難時，每頭可注射百分之十沙發美星或沙發美拉淨每天二至五百西西，一次用畢。最近作者經試用臺灣氣胺公司出品的百分之二·五金黴素油劑（Aureomycin Suspension）每頭每次注射一西西，效果亦大。



，視重愛是也子
，意注着朋別往來
！去來學通萬十
！喜歡上明光孫



，度程有看也子疾
，（開好手遊）駝駱願（他）伊給通曉
，學着部作工何任
。（業職）路頭無（會不才）貴者來將



，促督着習複本課
，局結好人的書讀
，足充有線光是鄰
！樂快上書讀（上晚）時晚