



二、在本省中南部一至七月間處理的效果最好，八月以後很不穩定。

三、用奈乙酸處理無效的鳳梨植株，芯部常發生多數短葉，並有延遲自然抽穗期和降低自然抽穗率等缺點。(黃季春)

**柑桔落果原因很多**

【問】：一、三年前種植三百株柑桔今年所生果實無幾，是何原因？

二、有的會落果，是何原因？如何處理？

【答】：一、三年前種植柑桔，若開花結果須摘去，使植株樹勢旺盛，樹形更大。

二、柑桔落果因為開花，初期結果太多，乾燥過久或乾燥後遇暴雨，病蟲為害，風害和積水等關係。防止方法因落果原因而不同，一般在花謝時噴射四至十萬倍二十四D 溶液，對於防止落果有效。(翁仁祿)

**南部可以種草莓**

【問】：一、在本省南部可種草莓否？二、草莓種苗何處有售？每株價若干？

【答】：一、本省南部可栽草莓，南部因為十二月至四月草莓結果採收期間雨量較少，果實的品質和產量可能會比北部良好。現在鳳山熱帶園藝試驗所正開始進行適於南部栽培的草莓優良品種百種試驗中，預定二、三年後可能選育優良品種推廣。

二、草莓種苗請向臺北市迪化街臺灣農產企業公司函詢。(陳文郁)

**洋菇用碳酸鈣為好**

【問】：洋菇用碳酸鈣和建築用生石灰有何區別何者為宜？(新竹市中正里中央路三巷五號吳生松)

【答】：一、在化學式結構上碳酸鈣是CaCO<sub>3</sub>，生石灰及消石灰的成份三種都不同。洋菇以碳酸鈣為好。(胡開仁)

**採蔴用甘藷耐旱又豐產**

【問】：一、採蔴養豬用蔴廿五號、K廿五號是否耐旱？各改良場供應蔴苗否？

二、K廿五號甘藷不耐寒，有無其他特性？(新竹縣新豐鄉埔和村一號黃增林)

【答】：一、蔴廿五號、K廿五號、蔴苗具有耐旱性，各改良場數量不多，嘉義農業試驗分所有少量可推廣，農友如在八月間附郵六元給該分所收，可送蔴試種，贈完為止。

二、任何甘藷品種都不耐寒，前述兩品種，最優良的特性是每次刈蔴後，新芽很多，仲長亦比其他品種快。因此同期內的蔴產量比其他品種多。(簡金寬)

**甘蔗肥料施雜穀要注意**

【問】：復合肥料施在甘蔗很好可否施在雜穀上？(高雄縣大寮鄉昭明村七十四號張開漢魯)

【答】：甘蔗復合肥料中氮、磷、鉀，配合量是二十：五：十，原供甘蔗用。如無其他肥料可用，必須用在雜穀時，要看那種作物，所需三要素配合量為何，不足的要另補充。(林永昕)

**施用「愛果速」要適時**

【問】：一、用愛果速藥品處理鳳梨開花仍舊較慢，有何原因？

二、本省南部何時施用最宜？(嘉義縣民雄鄉大崎村頂牌十一號吳光華)

【答】：一、市售處理鳳梨提早開花用品「愛果速」可能是植物荷爾蒙奈乙酸的製品。處理效果受氣節影響極大。

**農藥成份標準 保證品質優良**

**經銷處**

- |           |                  |
|-----------|------------------|
| 臺北：新泰藥業商行 | 臺北市通化一段二四九號      |
| 宜蘭：祥豐農藥行  | 臺北市通化一段231號      |
| 桃園：豐年農藥行  | 桃園縣中壢鎮民權路35號     |
| 苗栗：民生農藥行  | 苗栗縣竹南鎮八德街四四號     |
| 南投：泰生農藥行  | 南投縣南棧鎮民權路一三三號    |
| 臺中：進豐農藥行  | 臺中市向上路一段二號之五     |
| 臺中：生光農藥行  | 臺中市興中街十三號        |
| 彰化：益興農藥行  | 彰化縣鹿港鎮中華路327號    |
| 彰化：益興農藥行  | 彰化市民生路一六六號       |
| 雲林：益興農藥行  | 雲林縣虎尾鎮光復路48號之1   |
| 嘉義：益興農藥行  | 嘉義縣義竹鄉六村村3鄰199號  |
| 高雄：蓬萊農藥行  | 高市公國路一七三號        |
| 高雄：富農農藥行  | 高雄市民權一路150號      |
| 屏東：元山化工行  | 屏東市中正路90號        |
| 花蓮：聯益成行   | 花蓮市中山路8號(彰化銀行對面) |



生標 牌

巴拉松乳劑  
I M 乳劑  
馬拉松乳劑  
安特靈乳劑  
地特靈乳劑  
DDT 乳劑  
魚藤精乳劑  
利我農乳劑

**中農化工廠股份有限公司出品**

**現貨供應**

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六九〇  
工廠：台北縣泉美鎮中正路三一七號