

耕土內，水不發展，所以，基肥的施用深度，以十五至十八公分爲宜。

生育期間應儘量避免斷根。立支架以後追肥時，也無須開條溝，以免引起斷根。

每十公畝地施肥標準如下：
 氮素二十八至三十二公斤
 磷質十二至十六公斤
 鉀質二十四至二十八公斤

氮素和鉀質的四成，作基肥施用；其餘六成分爲四至五次追肥。

磷肥宜與堆肥混合作爲基肥，每十公畝地的堆肥施用量（腐熟堆肥）約三千公斤。（堆肥的成分，不計算在上述三要素內。）

一 病蟲的防治

「臺北二號胡瓜」植株強壯，且抗病，但仍需注意病蟲害，才有良好的收成。其要點如下：

用好種子 才有好收成
 注意
種苗繁殖場的優良種子

雜交種大胡瓜 臺北雜交二號
 種子開始供應

本省首次正式推廣的雜交蔬菜品種，臺北區農業改良場育成。

果肉肥厚脆嫩，無苦味，深爲主婦歡迎，生長旺盛，栽培容易，產量特高。

種子包裝精美，每包淨重十五公分，足夠一厘地栽培之用，每包售價十六元，請向各大種子行洽購。（郵購另加寄費二元）
 郵購請利用郵政劃撥帳戶中字第2804號，至本場申購。

生產者農林廳種苗繁殖場

臺中縣新社鄉大南村

柑桔果樹潛葉蟲

(エカキムシ) 特效藥

日製三洋牌

400cc × 20

硫酸ニコチン 40

果樹、蔬菜、瓜類、菸草、葉粉、夜菇、蚜蟲、介殼蟲、紅蜘蛛、木虱、白粉虱、其他害蟲、蚊、蠅、馬、蠟、水、吃、心、蟻、蟲、等。

防治

製造元：日本三洋化學株式會社

經銷處：立豐農藥行

豐原鎮市前街六號

TEL 868轉

高雄區農業改良場和屏東縣政府合作，於上(七)月二十一日舉辦屏東縣綜合養豬廣播座談會，詳細內容，將於最近刊出。

△預告▽

- (1) 爲防治露菌病，宜用稻草覆蓋畦面。
- (2) 注意合理施肥（尤其是鉀肥），使植株強壯。不可有斷根現象。
- (3) 種子宜用「賜保根」拌種消毒，預防炭疽病、黑星病和疫病發生。
- (4) 於幼苗期和成長期，每隔十天噴射「大生七八」四百倍液一次。
- (5) 如有白粉病發生，可噴射一千倍「可利生」液防治。
- (6) 噴射「賽文」一千倍液，防治守瓜，減少胡瓜毒素病傳播的機會。噴射「馬拉松」八百倍液，防治有翅蚜蟲，以防毒素病蔓延。

* * *

興農種子公司

本行 臺北縣三重市重新路三段一〇八號
 電話：九七二一
 連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號

蕃茄耐熱性品種如下：
 ▲夏光 ▲夏冠 ▲興農山 ▲興農山 ▲興農山
 ○詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識
 函索付郵二元

興農飼料 它比任何品種，維他命高百分之二十(可節省許多高貴的飼料)栽培瑞典燕苔者，請願此品種比較，比較！
農友們！增加你的收入，
 品種好壞，它影響到你一年之收益，期望變成泡影
現貨供應 照美、日、各國種子已陸續進口了歡迎



最新廣効性殺蟲劑 (農林廳登記證 農藥字第61號)

固殺松乳劑 保證原裝！

(Gusathion E C)

能殺：水稻二、三化螟蟲，柑桔，棉花，鳳梨，大豆，蔬菜以及各種果樹之一切害蟲，且對門粒松，富粒多已生抗性之害蟲亦具有著效。

日本三共製藥株式會社出品保證原裝！

タカボルドウ 水銀ボルドウ
 リオゲン錠 トクエース (藥効增強劑)
 新グラミン 展着劑 ヘブタ粉劑

臺灣經銷：臺灣南興泰貿易有限公司
 臺中市市府路116號 TEL: 4542

現貨供應
 北部區：大信農產行 臺北市德化街一段221號
 榮華種子行 三重市重新路一段72號
 南部區：洽豐農產行 北港鎮大同路84號