

耕土內，水不發展，所以，基肥的施用深度，以十五至十八公分爲宜。

生育期間應儘量避免斷根。立支架以後追肥時，也無須開條溝，以免引起斷根。

每十公畝地施肥標準如下：
 氮素二十八至三十二公斤
 磷質十二至十六公斤
 鉀質二十四至二十八公斤

氮素和鉀質的四成，作基肥施用；其餘六成分爲四至五次追肥。

磷肥宜與堆肥混合作爲基肥，每十公畝地的堆肥施用量（腐熟堆肥）約三千公斤。（堆肥的成分，不計算在上述三要素內。）

一 病蟲的防治

「臺北二號胡瓜」植株強壯，且抗病，但仍需注意病蟲害，才有良好的收成。其要點如下：

用好種子 才有好收成

注意

種苗繁殖場的優良種子

雜交種大胡瓜 臺北雜交二號 種子開始供應

本省首次正式推廣的雜交蔬菜品種，臺北區農業改良場育成。

果肉肥厚脆嫩，無苦味，深爲主婦歡迎，生長旺盛，栽培容易，產量特高。

種子包裝精美，每包淨重十五公分，足夠一厘地栽培之用，每包售價十六元，請向各大種子行洽購。（郵購另加寄費二元）
 郵購請利用郵政劃撥帳戶中字第2804號，至本場申購。

生產者 農林廳種苗繁殖場

臺中縣新社鄉大南村

- (1) 爲防治露菌病，宜用稻草覆蓋畦面。
- (2) 注意合理施肥（尤其是鉀肥），使植株強壯。不可有斷根現象。
- (3) 種子宜用「賜保根」拌種消毒，預防炭疽病、黑星病和疫病發生。
- (4) 於幼苗期和成長期，每隔十天噴射「大生七八」四百倍液一次。
- (5) 如有白粉病發生，可噴射一千倍「可利生」液防治。
- (6) 噴射「賽文」一千倍液，防治守瓜，減少胡瓜毒素病傳播的機會。噴射「馬拉松」八百倍液，防治有翅蚜蟲，以防毒素病蔓延。

△預告▽

高雄區農業改良場和屏東縣政府合作，於七月二十一日舉辦屏東縣綜合養豬廣播座談會，詳細內容，將於最近刊出。

柑桔果樹潛葉蟲

(エカキムシ) 特效藥

日製三洋牌

400cc × 20

硫酸ニコチン 40

果樹、蔬菜、瓜類、菸草、夜菇、洋蛭、介殼蟲、盜蟲、紅蜘蛛、木蠹、白蠹、其他害蟲。


防治

製造元：日本三洋化學株式會社

經銷處：立豐農藥行

豐原鎮市前街六號

TEL 868轉



最新廣効性殺蟲劑 (農林廳登記證 農藥字第61號)

固殺松乳劑 保證原裝!

(Gusathion E C) 現貨供應

能殺：水稻二、三化螟蟲，柑桔，棉花，鳳梨，大豆，蔬菜以及各種果樹之一切害蟲，且對門粒松，富粒多已生抗性之害蟲亦具有著效。

日本三共製藥株式會社出品保證原裝!

タカ	永銀	ポルドウ	水銀	ポルドウ
リオ	ゲン	錠	トク	エース (藥効增強劑)
新	グラ	ミン	展	着劑
			ヘ	ブタ
				粉劑

臺灣經銷：臺灣南興泰貿易有限公司
 臺中市市府路116號 TEL: 4542

現貨供應

北部區：	大信農產行	臺北市迪化街一段221號
	榮華種子行	三重市重新路一段72號
南部區：	洽豐農產行	北港鎮大同路84號

興農飼料

興農飼料，它比任何品種，維他命高百分之二十，可節省許多高貴的飼料！栽培瑞典燕苔者，請願此品種比較，比較！

農友們！增加你的收入，品種好壞，它影響到你一年之收益，期望變成泡影，現貨供應，照美、日、各國種子已陸續進口了歡迎

▲美國大五寸人參
 ▲美國紅心五寸人參
 ▲美國瑞典燕苔
 ▲美國金門結頭菜
 ▲興農飼料蘿蔔四〇二八號

蕃茄耐熱性品種如下：
 ▲夏光▲夏冠▲興農梨山▲興農玉山▲陸化二號等
 詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識
 函索付郵二元印寄

輸入元 林興農行股份有限公司
 總行：臺北縣三重市重新路三段一〇八號
 電話：九七七一
 分行：臺中縣金一四二一
 電話：二一八八
 連絡處：豐原鎮中山路二八二之一號