

注意

颱風是香蕉最大的災害。現在，又到颱風的季節了，下面提出颱風前和颱風後應該做的幾種工作，以供蕉農們參考。

颱風前的準備

(一) 不管山地平地，種植防風竹林，都可以收到很大的效果；長枝竹最適合防風的目的。在香蕉園向風的一側，種植一行長枝竹，每公尺一株。大而積的香蕉園，每隔一百公尺設一防風林帶。

防颱

倒伏。

(二) 架立支柱，起碼每株一柱。沒有架立支柱的，要馬上去做；已經有支柱的，要經常檢查和調整繩綳的位置。
(三) 注意排水，疏通排水溝。排水不良的地方，香蕉容易

颱風後的措施

已經抽穗結果的植株


- ① 葉片吹裂，假莖沒有折斷的植株，果實仍能成熟。但應看實際情形，疏果一段到三段。
- ② 植株折彎，但中心果軸沒有折斷，而果實已達三、四分熟的，也要疏果二到四段，並用支柱撐著已傾斜的果實。
- ③ 偽莖中間的果軸已斷，但植株未完全斷，而果實熟度已達五、六分熟時，仍有希望採收。未達五分熟的，要全株砍掉，以促進旁邊的新株生長。
- ④ 整株倒伏，果實在四、五分以上的，仍可以採收一部份。颱風停止後，即刻以稻草或蕉葉覆蓋在果實下面，以免與泥土接觸，發生腐爛。果實上面也要用稻草或蕉葉覆蓋，以免曬黑。
- ⑤ 整株傾斜時，應用竹竿支柱，以免下雨後全株倒伏，並視情形疏果與覆蓋果實或包紙。

將要抽穗結果的植株

如果只是葉片被吹成絲狀，以後還是能結果的，但仍須疏果。如果植株已折斷或倒伏，應該砍掉以促進萌芽的發育。因為勉強保留，以後結果也是困難的。

比較幼年的植株

如果只是葉片被吹裂成絲狀，可以聽



標準成份藥農 保證品質優良

經銷處

- | | |
|------------|---------------------|
| 臺北：新運業農藥行 | 臺北市迪化一段二四九號 |
| 宜蘭：聯豐農產資材行 | 臺北市迪化街一段 231 號 |
| 桃園：豐年農產資材行 | 桃園縣中壢鎮民權路 35 號 |
| 苗栗：惠農行 | 苗栗縣竹南鎮八德街四五號 |
| 南投：泰生保苗行 | 南投縣南投鎮保民路一—三號 |
| 臺中：進光農藥行 | 臺中市向上路一段二號之五 |
| 彰化：茂豐藥行 | 臺中市崇中街十三號 |
| 彰化：德榮藥行 | 臺中縣縣峰鄉中正路 327 號 |
| 彰化：德榮藥行 | 彰化市民生路一六六號 |
| 嘉義：豐農藥行 | 雲林縣虎尾鎮光復路 48 號之 1 |
| 嘉義：豐農藥行 | 嘉義縣義竹鄉六柱村 3 鄰 199 號 |
| 高雄：聯業農資材行 | 臺南市公園路一七三號 |
| 高雄：富農植苗行 | 高雄市林森一路 150 號 |
| 屏東：光山化工行 | 屏東市中正路 90 號 |
| 花蓮：邱協成種子行 | 花蓮市中山路 8 號 (彰化銀行對面) |



巴拉松乳劑
 P M 乳劑
 馬拉松乳劑
 安特靈乳劑
 地特靈乳劑
 D D T 乳劑
 魚藤精乳劑
 利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇
 工廠：台北縣興美鎮中正路三—七號

現貨供應

其自然。如果植株已折損，在折損處中心，挖一孔洞，使新葉可以抽出，上部葉片儘可能保留而不切離，這樣葉片的養分可以繼續供給植株生長的需要。但必需在沒有蕓象鼻蟲區域，才可以採用此種處理。(農林廳)

八九月栽培改良大白杄蘿蔔

臺灣蘿蔔(菜頭)的種類很多，通常可以分爲在來種(華南型)和美濃種兩大類。

在來種栽培較多，特點是辣味淡，汁液多，風味好，適合本省口味。其中又分做「杄仔」、「仔仔」、「冬瓜白」和「梅花」四類。

各類中的栽培品系如下：
杄仔：馬耳杄、牛杄、四十日杄、六十日杄、大白杄、長杄。

仔仔：四十日仔、六十日仔。

冬瓜白：長冬瓜白、短冬瓜白。

以上三類都是早、中生種，葉部立起，耐熱，適合夏秋栽培。

梅花：是中、晚生種，品質優良，不易空心。主要的品系有小梅花、大梅花(四真、浮頭、沉頭、南畔州)。

美濃早生：較耐低溫，能抵抗毒素病，適合水田裏作，是主要的加工品種，栽培面積最廣。缺點是辣味強，容易空心。

各類蘿蔔的播種月份、最適播種月份，和播種至始收穫的日數如下：
杄仔：中南部播種月份四至十月，最適播種月份八至十月上旬，播種至始收穫日數三十五至五十天。


仔仔：各地播種月份六至十或三至四月，最適播種月份九至十月，播種至始收穫日數四十至六十天。

冬瓜白：中南部播種月份七至十一月上旬，最適播種月份九至十月，播種至始收穫日數五十天。

梅花：北部播種月份九至二月，最適播種月份十至十二月；中南部播種月份十至一月，最適播種月份十至十二月；播種至始收穫日數都是八十天。

美濃早生：北部播種月份八至三月，最適播種月份九至十一月；中南部播種月份九至一月，最適播種月份十至十二月；播種至始收穫日數都是六十至七十天。


新竹區農業改良場所育成的「改良大白杄」，最適合八月下旬至九月間播種，播種後第五十五至五十五天可以採收，品質特別好，產量特別高，栽培利益特別好。栽培方法請參看上期「豐年」第十七頁。(陳培昌)



(格合爲林一第邊右) 株母杄白大




藥 農 豐 正


螟蟲 防治 

請用 **美粒松** 乳劑

低毒一本劑只有巴拉松五分之一毒性
浸透力一比巴拉松強三倍以上

螟蟲，蚜蟲 防治 

請用 **特殺松** 乳劑

特效藥：
美果素 乳劑 

爲紅蜘蛛，蔗綿蚜，果樹捲葉蟲之特效藥

能敵師 乳劑
防治：稻螟蟲，蚜蟲

可樂收 乳劑
防治：棉花蟲，蔬菜蟲

富特靈 乳劑
爲蔬菜蟲，果樹蟲，稻蟲之剋星

正豐化學股份有限公司
臺中縣霧峯 電話：六三號