

其自然。如果植株已折損，在折損處中心，挖一孔洞，使新葉可以抽出，上部葉片儘可能保留而不切離，這樣葉片的養分可以繼續供給植株生長的需要。但必需在沒有薺象鼻蟲區域，才可以採用此種處理。(農林廳)

\*

\*

\*

## 八九月栽培改良大白芥蘿蔔

臺灣蘿蔔(菜頭)的種類很多，通常可以分為在來種(華南型)和美濃種兩大類。

在來種栽培較多，特點是辣味淡，汁液多，風味好，適合本省口味。其中又分做「大芥仔」、「研仔」、「冬瓜白」和「梅花」四類。

各類中的栽培品系如下：

大芥仔：馬耳芥、牛芥、四十日芥、六十日芥、大白芥、長芥。

研仔：四十日研、六十日研。

冬瓜白：長冬瓜白、短冬瓜白。

以上三類都是早、中生種，葉部

立起，耐熱，適合夏秋栽培。


梅花：是中、晚生種，品質優良，不易空心。主要的品系有小梅花、大梅花(四真、浮頭、沉頭、南畔州)。

美濃早生：較耐低溫，能抵抗毒素病，適合水田裏作，是主要的加工品種，栽培面積最廣。缺點是辣味強，容易空心。

各類蘿蔔的播種月份、最適播種

月份，和播種至始收穫的日數如下：

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| 研仔：各地播種月份六至十或三  | 至四月，最適播種月份九至十月，播種至始收穫日數四十至六十天。 |
| 大芥仔：中南部播種月份四至十月 | ，最適播種月份八至十月上旬，播種至始收穫日數三十五至五十天。 |
| 冬瓜白：長冬瓜白、短冬瓜白。  | 以上三類都是早、中生種，葉部立起，耐熱，適合夏秋栽培。    |



(合株一株一株) 大白芥子母株

冬瓜白：中南部播種月份七至十一月，最適播種月份九至十月，播種至始收穫日數五十天。

梅花：北部播種月份九至二月，最適播種月份十至十二月；中南部播種月份十至一月，最適播種月份十至十二月；播種至始收穫日數都是八十天。

美濃早生：北部播種月份八至三月，最適播種月份九至十一月；中南部播種月份九至一月，最適播種月份十至十二月；播種至始收穫日數都是六十至七十天。

新竹區農業改良場所育成的「改良大芥仔」，最適播種月份九至十一月，間播種，播種後第五十至五十五天可以採收，品質特別好，產量特別高，栽培利益特別好。栽培方法請參看上期「豐年」第十七頁。(陳培昌)



# 正豐農藥

螟蟲防治

請用

**美粒松** 乳劑

低毒一本劑只有巴拉松五分之一毒性  
浸透力一比巴拉松強三倍以上



螟蟲，蚜蟲  
防治

請用

**特殺松** 乳劑



特效藥：

**美果素** 乳劑



為紅蜘蛛，蔗綿蚜，果樹捲葉蟲之特效藥

**能敵師** 乳劑

防治：稻螟蟲，蚜蟲

**可樂收** 乳劑

防治：棉花蟲，蔬菜蟲

**富特靈** 乳劑

為蔬菜蟲，果樹蟲，稻蟲之冠星

正豐化學股份有限公司

臺中縣霧峯 電話：六三號