

農友經驗

南部八月秋播棉花

並不影響一期水稻

屏東縣第二期水稻的種植期，恰遇颱風季節，收成靠不住，平均每公頃能收五千斤就算好的。還不如改種棉花，收益比二期水稻和一期製作大豆可增加約四千元。同時田地輪作，可避免水稻空息病的為害。

依過去三年的經驗，八月中旬種棉花收量最高，因為這季節南部的平均溫度更為適合。並可減少颱風吹倒後，所需處理工資和增施肥料的損失。

八月所種的棉花，最慢在明年一月中能收成，對於一期水稻並無影響。而且在八月種棉花的預定地，當一期稻收穫後，中間還可以種一期綠肥，增加地力。

棉花結鈴期在冬天，適逢南部乾燥期，遇到雨不容易腐爛。病蟲害較少，預防比較方便。棉花的損失也有限，普通每十天噴射一次巴拉松，大部份的蟲害就能防治了。(屏東縣枋寮鄉天時村二十七號陳文山)

自做甘藷羊羹

既廉價又衛生

一般農家小孩子，都喜歡吃甘藷，尤其在糊仔甘藷收穫時期，價錢更便宜，我們可利用甘藷羊羹，給孩子吃，比吃新鮮甘藷既衛生又營養。

用的材料是甘藷三斤，洋菜(鴨甲)十公克、糖四百公克、水一千二百西西。做法如下：

(一)先把甘藷洗淨用水煮熟溶化，和水一樣透明後再加糖溶解。

(二)洋菜也洗乾淨，浸水，連同冷水煮成溶化，和水一樣透明後再加糖溶解。

(三)把(一)和(二)混合均勻，放入盤子冷卻成成品，普通在夏天可放約一星期，在冬天約可存放半個月。存放甘藷羊羹的地方最好用可以密閉的瓦罐，否則因為甜味很濃容易引起螞蟻來嚙食。(雲林縣西螺鎮廣里卅一號張銀水)

農耕機收甘藷

可以節省時間

農友們常用耕牛收穫糊仔甘藷，要先把甘藷剷掉，然後每畦左右各犁一次，中間再犁一次，這種方法很浪費時間和勞力。

我每次收穫糊仔甘藷，都採用竹下式VKASU型驅動式耕耘機，收穫方法很簡單，先把耕耘部安裝好，然後把中間的耕耘刀拆除三支，但需需拆掉幾支才合用，可視甘藷畦的大小而定，目的是避免損傷甘藷。

耕耘刀拆除了一部份後，僅留下兩邊的耕耘刀，再把雙面犁裝好即可應用。

開始犁地時，耕耘部也要發動，這樣甘藷蔓就同時被兩邊的耕耘刀割斷了，每畦犁一次後即可收穫。(彰化縣溪湖鎮大竹里彰水路八十一之三號徐朝恭)



左農恭朝徐

Dipterex

S.P. 80

地特松水溶粉80% デイプテレックス

螟蟲特效藥

低毒：毒性為巴拉松二百分之一 (LD50 rat 625mg/kg)

可溶於水：浸透力強。



請認明拜耳商標是品質高超信用可靠之標記

現貨供應：正豐化學股份有限公司

地址：臺中縣霧峯鄉草湖路2號

電話：霧峯63號

總代理：中德貿易有限公司

臺北市博愛路98號 電話：33157・33158・33159