

火雞有六種主要的疾病



· 龍明蘭 ·

嘉義、高雄兩縣有飼養火雞的示範村，其他各地飼養火雞的也在逐漸增多。因此，對於火雞的主要疾病，最好先有充分的認識，免得導致經營的失敗。

雞痘

因過濾性病毒的侵襲，可以引起「雞痘」病。在春秋間蚊子多的時候較為流行，蚊子能傳染這種病。

在頭部無毛的地方，如頭頂、肉垂、臉、鼻、眼、角、口角長出像疣狀的痘點，痘點上伴有似乾酪的痂。雞有時也會發生在脚部無毛處。眼臉發痘時，可蔓延到結膜而生眼炎，使火雞失明。雞痘發生在嘴上的時候，可侵襲口內粘膜而形成白喉性的病變，使火雞不能採食和下嚥而死亡。這種病很難治療。依作者的經驗，可設法阻止患部惡化，使病雞耐過木病；方法如下：先用錐子除去痂皮，取淨腐肉，用碘酒消毒，再塗上碘仿散和氨茶磺胺 (Sulfanilamide) 的混合劑。混合方法是二份碘仿散加一份氨茶磺胺。一般來說以生在口腔內的雞痘最難治療，死亡率也最高。

可用雞痘疫苗預防雞痘。火雞孵出後一週即可接種雞痘疫苗，方法是用左手捉住火雞，使腿部露出，用右手在腿部（兩脚任何一脚都可）拔去一小塊的毛。用火柴棒粘一點痘苗放在拔去毛的地方，來回小心的磨擦，使它出血而不流血的程度即可。種痘後的五、六天，要查看一次是否出痘？如果沒有出痘，必須再種一次。直到出痘時為止。

黑頭病

黑頭病是一種名叫 *Histomonas meleagridis* 的原蟲寄生所引起，也能使雞感染，但雞的抵抗力較強，

而常把那種原蟲再傳染給火雞。傳染的方法是：黑頭病的原蟲大部份時間寄生在盲腸裏，常被同時寄生在盲腸裏的盲腸蟲 (*Heterakis gallinae*) 所吞食，被吞食後的原蟲，通過盲腸蟲的腸壁轉移到卵巢裏，在卵細胞內增殖。然後那原蟲即被包在盲腸蟲的蟲卵內，隨糞排出。當火雞誤食含有盲腸蟲卵的糞或採食染有這糞便的草類時，即被感染。所以盲腸蟲和雞，成為火雞黑頭病的中間媒介。

病雞都頹喪、垂翼、把頭伸在翼下竚立、食慾消失、有時糞便成黃綠色、頭部鬱血而成黑色。任何過齡的火雞都會感染這種病。尤其對六至十八週齡的火雞，威脅特別嚴重，感染這病的死亡率是百分之五十至一百。

黑頭病無法治療，只能預防：火雞應和雞分開飼養，養過雞的場地或牧草地在兩年內不能再飼養火雞。同時要設法驅除盲腸蟲：每公升體重用

○五克的硫二苯胺 (Phenothiazine) 可得百分之五以上的驅蟲效果。這種藥物同時也能驅除蛔蟲。

腫頭病

家禽中的「鼻卡達兒桿菌」 (*Hemo philus gallinarum*) 可引起腫頭病，流鼻涕，食慾不振，眼周圍和鼻附近頭部腫脹。是一種慢性病，肌肉注射鏈黴素可治癒。

水田用水嘸通爭


劉興欽



近來田阿阿人時不
而無水土阿二
坐外物同
（多不）替，源水在
家冤在時不



時有半後二
搶相也爭
拍相也爭
架打）果結無
起（架打）果結無



阿明阿池無
禮無限有
卡禮阿給讓
明聽（較）用明阿給讓
！種來着（物作他其）物別水無

