

？蟲害的床苗草菸治防樣怎

一珍玉張

由於於種的微小（每臺兩約有四十萬粒），和幼苗的嫩弱，一般常是但認為並不重要的小動物，如螭蟻、蚯蚓、螻蛄和蟋蟀等，也能對菸草苗床造成嚴重的損害，所以，應特別注意防治苗床害蟲，以助育苗工作成功。

播種以前，第一個要考慮的問題就是選擇適當的苗床用地。不少菸農爲菸苗管理方便計，常選擇住家附近的菜園作爲菸草苗圃；從防治害蟲觀點說，這是不妥當的。因爲菜圃經常在種植的，爲害蔬菜的害蟲，尤其是地下害蟲，很容易轉來爲害菸田。因此，苗床以選用水田爲宜。

苗床地經選定後，在播種前三、四天，最好先灌水一次，經浸水一、二天後，再予翻耕，使土壤曬乾。這樣，潛伏在內層土壞的害蟲和蛹等，也有可能被太陽晒死！

土壤消毒殺蟲

(1) 福爾麻林消毒：播種前二週，苗床地經整耕後，以一份福爾麻林液加水五十倍，用噴水壺淋注。每坪苗床約需藥液十公升，然後覆蓋草席或稻草等，以避免藥液蒸散；二至三日後才可將覆蓋物移去。這樣不但可以殺死土壤中的病原菌，同時對土壤害蟲也有燻殺作用。

(2) 施用殺蟲劑：為澈底防治地下害蟲，可施用長效性的「阿特靈」。苗床整地施肥後，以百分之四十的「阿特靈」粉劑，每坪地約用一公分，混入二百至三百倍水中，用噴霧器洒在床面上，再用鐵耙來回耙動數次，使藥液均勻混入土中，然後播種。因為福爾麻林液在土壤中很容易蒸散，而「阿特靈」藥效可維持二十個月之久，所以經過土壤

利用毒餌誘殺夜盜蟲、切根蟲、螻蛄、蟋蟀和
蠅蠍等，隨時可用，且對幼苗沒有藥害，可說是最
理想的方法。通用的調配法如下：

玉米粉或米糠：十公分	麵粉：十公分
糖：四公分	矽氟化鈉：一・五公分
水：適量	

誘殺毒餌配法

利用毒餌誘殺夜盜蟲、切根蟲、蝼蛄、蟋蟀和
螞蟻等，隨時可用，且對幼苗沒有藥害，可說是最
理想的方法。通用的調配法如下：

蚯蚓能翻鬆土壤，改良土壤的化學和物理性狀，所以算是益蟲。但在苗床用地內，蚯蚓的數目過多時，會將平整的床面破壞無遺，影響育苗工作。驅除蚯蚓最簡單易行的方法，是在苗床地選定後，先行灌水一次，使牠們來到土面，然後驅家禽餵食。施用「阿特靈」可濕性粉劑，或「安特靈」和「富粒多」等殺蟲劑，以及氯化鋁肥料和昇汞水等，也可以收到防治蚯蚓的效果，但是，「阿特靈」外，其他數種或具劇毒，或對植物容易發生危害，最好避免使用。

螞蟻能搬運菸種，常將苗床的種子一掃而空，不但浪費人工和菸種，且因延誤農時，影響菸葉的生產。如上項所述，於播種前施用「阿特靈」可濕性粉劑，可收防治效果。此外，在播種後可用百分之五或百分之十的DDT粉劑，撒佈於苗床四週的土面，以防止附近螞蟻羣入侵。

消毒的苗床，在播種前最好施用殺蟲劑，這樣就更安全了。

栽 菇 必 備 之 寶 藥

美國聞名雅克斯利洋菇研究所多年研究之結晶
世界洋菇協會公認之真正
中央標

中央標準局註冊商標
第14974號

世界开始商會公認第一品
洋菇專用綜合營養劑

美世農

MYCELON

二五三島之珍藥（對菇農好，對菇廠好，對國家好）

特點
①係真正洋蔥專用劑（與普通植物荷蘭殺劑或其他類似改良劑性質大不相同）
②鐵的重質！增產35%—85%（有各地收姑記錄可稽）然每坪貝多化三元八角。
③經各農會各大園圃各大栽培場實地使用而頗受好評又愛用已三年之久。
④姑狀大堅質而重，純白，無畸形之一級洋蔥，沿線生長正常旺盛而有力，發菇普遍而均勻，對有風冷氣，
水溝病害等有相當之抵抗力等（請閱說明書）
⑤於蔬菜時施用（於第一或第二翻耕開始施用最為理想）愈早使用效果愈大。

限在農會配銷 總經銷：太原工業原料行 臺中市繼光街123號 電話：3543

◎本行另備新舊日本原裝最新式使用簡便附詳細比色表B.T.B.試驗紙。