

稻水期第二

！病枯紋意注

樹火何

本省的第二期水稻，在最高氣溫下開始栽培，這時的環境，很適合稻紋枯病的發生和蔓延，請大家注意防治，以免被害。

病徵

稻紋枯病通常發生在稻株的葉鞘、葉和穗等，但是主要在葉鞘呈現橢圓形，週緣暗褐色，內部為灰色的斑點。這樣的斑點，從下面葉鞘發生，病葉漸次呈黃色，衰弱而枯萎。此外又在葉鞘或葉子的病斑上，形成扁平圓形或橢圓形的「菌核」，成為病菌的傳播源。這種「菌核」，多在雨後形成，雨霽乾涸後容易脫落，因此，並不容易看到。

稻紋枯病是由黴菌所引起的病害，除了水稻，很多種雜草都會發病。水稻分蘖期，由「菌核」發出菌絲，侵入水稻的葉鞘內側，呈現病斑。通常在抽穗後三星期開始至抽穗之間蔓延。

紋枯病在氮肥和有機物質多的稻田，也就是說，在水稻生育繁茂時較易發病，所以，多施肥料時應特別注意。

防治

防治稻紋枯病，最重要的是要注意施肥方法，如果施用過多氮肥，應在追肥時加施鉀肥，以減少發病。



微病病枯紋稻

其次為注意灌溉；儘量保持流動澆水，也可以減少發病的機會。

至於藥劑防治，這幾年來所推廣的「多穗」、「阿蘇仁」、「紋枯乳劑」、「新阿蘇仁液劑」和「紋絕」等，對於稻紋枯病確實具有優異的防治效果，但如施肥方法不對的話，便會引起藥害，所以請農友們特別注意下列的幾點：

- (1) 藥劑的濃度，應以政府所推廣規定為標準：紋枯乳劑二千五百倍，新阿蘇仁液劑二千倍，多穗可濕性粉劑三千倍，阿蘇仁可濕性粉劑二千五百倍，紋絕可濕性粉劑二千倍。
- (2) 撒佈量應依水稻生育狀況決定，但每公頃須一千至一千二百公升以上。
- (3) 第二期水稻抽穗後三十至三十五天，就要行第一次施藥。這時葉鞘已發生病斑，應撒佈藥劑阻止蔓延。
- (4) 第一次撒佈藥劑後經十五天，行第二次噴藥；此時正是水稻孕穗期。早生稻較早抽穗，注意提早在水稻抽穗前施藥，以免發生藥害。
- (5) 藥劑應向葉鞘部噴射。

農藥成份標準 保證品質優良

經銷處

- 臺北：新隆藥業商行
- 宜蘭：隆興藥業商行
- 桃園：豐年農藥行
- 苗栗：東興農藥行
- 南投：民生藥行
- 台中：興豐藥行
- 台中：生光藥行
- 彰化：美豐藥行
- 彰化：日榮藥行
- 雲林：廣興藥行
- 嘉義：榮豐藥業商行
- 台南：新隆藥業商行
- 高雄：富農藥業商行
- 屏東：元興化工行
- 屏東：興隆藥業商行
- 臺南市：建化一街二四九號
- 臺南市：建化一街二四九號
- 桃園縣：中興路民權路35號
- 苗栗縣：南興八街四四號
- 南投縣：南投區民權路一四一號
- 台中市：中山路一四一號二樓五五
- 台中市：中街十三號
- 彰化縣：橋南街中街327號
- 彰化市：民生路一六六號
- 雲林縣：虎尾鎮光復路48號之1
- 嘉義縣：新豐路竹仔腳六村3鄰199號
- 台南市：公園路一七一號
- 高雄市：林森一街150號
- 屏東市：中興路90號
- 屏東縣：麟蹄鄉8號(中興路對面)



巴拉松乳劑  
P M 乳劑  
馬拉松乳劑  
安特靈乳劑  
地特靈乳劑  
DDT 乳劑  
魚藤精乳劑  
利我農乳劑

中農化工廠股份有限公司出品

現貨供應

總公司：台北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇  
工廠：台北縣鶯美鎮中正路三一七號