



蘆筍栽培

注意三點！

王進生

撒播方法·不宜採用

目前一般農友栽培蘆筍，為提高下種速度，節省播種勞力，多採用撒播法。撒播雖可提高下種速度，但是播種密度不均勻，且往往過密，容易使苗株早期老衰，即在播種後八十日左右，莖葉就開始變黃枯凋。

這樣的苗株，不但每株只有八、九條貯藏根，定植時不容易成活，就是對以後七、八年的產量，也有很大的影響。

所以，蘆筍的育苗方法，應以點播法為宜。行距（條距）、株距最少應各有九公分；如果土地充裕，最好放寬為十二公分。根據所定的距離，每處

只播一粒種子，如果缺株，也無須補播。點播法能使苗株生育整齊，有利苗株鑑別，便於淘汰不良株苗。

更新母莖

暫停採收

為了提高單位面積的產量，每株蘆筍都在春天留下二至三枝的母莖。但是，春天所留的母莖，經過九十天左右就呈老衰現象，變黃、枯凋，所以應在此時輪流更新母莖，使它繼續製造養分。

例如每株留三枝母莖時，應將先呈老衰的母莖刈去，再留一嫩莖（標準大小）為母莖。以後再逐次淘汰老母莖，續留新母莖代替。目前各地情形，都是更新母莖時間過遲，到了全植株呈現極端營養不良時才着急。到了這個地步，大多已無法生產嫩莖，即使能生產，也都很細小。

依據實際的經驗，母莖的更新應在六月中旬開始，繼續到下旬為止。在更新母莖時，尤應多施肥料，以促進新母莖的伸長。更新母莖後，是本省溫度最高的季節，所以應暫時停止採收，使植株恢復勢力。

開溝施肥·立即澆水

蘆筍的根羣（吸收貯藏根），分佈得既深且廣（周圍半徑都達一、二公尺），肥料的吸收範圍很大，所以，蘆筍的施肥，應以深施為宜。目前部分農友，因為不明瞭蘆筍根羣的分佈情形，施肥時只把硫酸銨或尿素放在根際土面，又不用耕土覆蓋，肥份不但易於揮發，且無法給蘆筍植株吸收利用。這種情形，在初年生的蘆筍圃地或新種植的地區特別多。

一般說來，施肥時宜先在行距間用牛犁開二一到二十四公分深的施肥溝施下肥料，澆水，然後覆土（植株小時不必培土過厚）。如無耕牛，可用鑽孔式施肥法，穿十五至十八公分深的孔穴，施下肥料後澆水。

開掘施肥溝時，應儘量避免斷根，尤以夏季高溫時應加倍注意。最好離開根際四十五公分左右開溝。

最近各地天氣異常乾旱，施肥時應同時澆水始可呈効。但是澆水應等地溫下降，即夜間八時到九時舉行，且以畦溝灌溉為佳。

世界可產量增加

根據美國農部的統計，一九六三至一九六四年世界可產量，將高達一百一十九萬噸。這數字比一九六〇至一九六一年的紀錄多出二萬六千噸。增產的地區，包括非洲、南美等地。

日本原裝 日本武藏野種苗園 採種
空運來臺 臺灣農業服務社 供應

一代雜交 寶冠 (ホウカン)

蕃茄 (ト マト) 種 夏冠 (サンマピンク)

每包淨重五公克四十元
豐年讀者八五折優待

郵政劃撥五一九
九號康導寫免收
運費。臺北市信
義路二段15巷33
號10號

蘆 美 華 盛 種 筍

長岡交配一號甘藍 美國全二大五寸人參
長岡交配二號甘藍 美國大切葉萬壽
長岡交配三號甘藍 美國小切葉萬壽
長岡交配四號甘藍 美國包心生菜
長岡交配五號甘藍 美國嫩莖萬壽
長岡交配六號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配七號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配八號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配九號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十一號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十二號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十三號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十四號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十五號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十六號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十七號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十八號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配十九號甘藍 美國加州大甜椒
長岡交配二十號甘藍 美國加州大甜椒

榮華種子行

專營環球各埠農業資材
農業種子及農藥農機
中藥種子及臺灣土產貨
三重市重新路一段七二號
郵政劃撥儲金一三五七一號
電話：九七二七四九號