

蘆筍栽培，注意三點！

・王進生・

撒播方法・不宜採用

目前一般農友栽培蘆筍，爲提高下種速度，節省播種勞力，多採用撒播法。撒播雖可提高下種速度，但是播種密度不均勻，且往往過密，容易使苗株早期老衰，即在播種後八十日左右，莖葉就開始變黃枯凋。

這樣的苗株，不但每株只有八、九條貯藏根，定植時不容易成活，就是對以後七、八年的產量，也有很大的影響。

所以，蘆筍的育苗方法，應以點播法爲宜。行距（條距）、株距最少應各有九公分；如果土地充裕，最好放寬爲十二公分。根據所定的距離，每處只播一粒種子，如果缺株，也無須補播。點播法能使苗株生育整齊，有利苗株鑑別，便於淘汰不良株苗。

更新母莖暫停採收

爲了提高單位面積的產量，每株蘆筍都在春天留下二至三枝的母莖。但是，春天所留的母莖，經過九十天左右就呈老衰現象，變黃、枯凋，所以應在此時輪流更新母莖，使它繼續製造養分。

例如每株留三枝母莖時，應將先呈老衰的母莖刈去，再留一嫩莖（標準大小）爲母莖。以後再逐次淘汰老母莖，續留新母莖代替。目前各地情形，都是更新母莖時間過遲，到了全植株呈現極端營養不良時才着急。到了這個地步，大多已無法生產嫩莖，即使能生產，也多很細小。

依據實際的經驗，母莖的更新應在六月中旬開始，繼續到下旬爲止。在更新母莖時，尤應多施肥料，以促進新母莖的伸長。更新母莖後，是本省溫度最高的季節，所以應暫時停止採收，使植株恢復勢力。

開溝施肥・立即澆水

蘆筍的根羣（吸收貯藏根），分佈得既深且廣（周圍半徑都達一・二公尺），肥料的吸收範圍很大，所以，蘆筍的施肥，應以深施爲宜。目前部分農友，因爲不明瞭蘆筍根羣的分佈情形，施肥時只把硫酸錏或尿素放在根際土面，又不用耕土覆蓋，肥份不但易於揮發，且無法給蘆筍植株吸收利用。這種情形，在初年生的蘆筍園地或新種植的地區特別多。

一般說來，施肥時宜先在行距間用牛犂開二十一到二十四公分深的施肥溝施下肥料，澆水，然後覆土（植株小時不必培土過厚）。如無耕牛，可用鑽孔式施肥法，穿十五至十八公分深的孔穴，施下肥料後灌水。

開掘施肥溝時，應儘量避免斷根，尤以夏季高溫時應加倍注意。最好離開根際四十五公分左右開溝。

最近各地天氣異常乾旱，施肥時應同時灌水始可呈効。但是灌水應等地溫下降，即夜間八時到九時時舉行，且以畦溝灌溉爲佳。

＊　＊　＊

世界可可產量增加

根據美國農部的統計，一九六三至一九六四年世界可可產量，將高達一百一十九萬噸。這數字比一九六〇至一九六一年的紀錄多出二萬六千噸。增產的地區，包括非洲、南美等地。

日本原裝　日本武藏野種苗園　採種
空運來臺　臺灣農業服務社　供應
一代雜交　蕃茄（トマト）種子
寶冠（ホウカン）
夏冠（サンマピンク）
每包淨重五公克四十元。豐年讀者八五折優待
郵政劃撥五一九九號康導崑免收滙費。臺北市信義路3段147巷33街10號

蘆筍
美麗華盛頓種
長岡交配一號甘藍
長岡交配二號白菜
長岡交配理想白菜
長岡交配60日白菜
長岡交配各類蕃茄
海谷三池中生甘藍
本產極早生高麗菜
純金澤白蕪甘藍
金門極早生結頭菜
純北京劍葉結頭菜
龍野川三年子牛蒡
日本砂村根深太葱
美國6811大五寸人參
美國大切葉萵苣
美國小切縮緬萵苣
美國包心生菜
美國嫩莖萵苣
美國加州大甜椒
京都三號結球白菜
花心半結球白菜
陽春甘藍（出口用）
燕麥（飼料用）
美國瑞典無菁飼料用
本產高脚紫雲英子
初秋甘藍（出口用）
其器他應中有西盡優有良歡種迎子賜，願農指藥教，農。
專營環球各埠農業資材
農業種子農藥農業機器
中藥種子及臺灣土產貨
榮華種子行
三重市重新路一段七二號
郵政劃撥儲金一三五七一號
電話：九七二七四九號