

農友經驗

甘藷增產可施調合肥

我種了一分三厘地甘藷，施了堆肥四千斤做基肥，經兩週後，再施硫酸三十斤，過磷酸石灰五十斤，作第一次追肥。第二次再經過兩週後，再施下蔗農服務社經銷的三號調合肥每包五十斤兩包，施用後經過一個月，甘藷發生有茂盛，到收穫時每個甘藷的重量平均約兩斤，共收穫六千五百斤，時價每百斤三十九元，售價為二千三百四十元，除肥料費三百七十元，盈餘得一千九百七十元，比較同一成本而全用化學肥的增收百分之六十，可見三號調合肥是一種很好的肥料，對甘藷的增產確實有很大的效果。(彰化縣埤頭鄉陸嘉村中華路廿六號蔡 森)

噴用農藥切記要適當

把握適當的時期：例如低溫多濕時要噴藥預防稻熱病；高溫多濕時要防螟蟲，更應該在螟蟲發生最高峰時開始噴藥。

噴藥部位要恰當：如為防治蚜蟲類或介殼蟲類，藥液必需噴在葉的背面為主。水稻螟蟲則以噴射稻的葉鞘為主。水稻紋枯病更應該噴射在葉鞘的地方。再如蔬菜類的白粉病、疫病、露菌病等應該噴射在葉的兩面，才能收到事半功倍的效果。

藥液份量要充足：各種藥液濃度，要依作物生育期的不同而改變，植株愈高大、愈繁茂的區域，藥液量應

愈多。但也不能隨便提高濃度而受藥害。如「阿蘇仁」是很貴的藥劑，通常兩千倍就能生效，又何必提高濃度去浪費呢？

噴藥時間要準確：氣溫高噴藥，作物易受藥害；人又容易中毒；藥劑也容易受陽光照射分解失效。所以噴藥時間最好能選擇陰天或下午二點以後較適當。

必需能對症下藥：如「巴拉松」的使用範圍雖然很廣泛，但不見得對樣樣害蟲有很好的效果。例如防治黑椿象，「巴拉松」就不如「賽文」，「BHC」或「安特靈」等有效。

播種施肥逆風較平均

很多農友們，在田間播種或施肥，為了節省時間，都不顧慮風向，總是來回的撒，這樣便是一順一逆，凡是順風撒的，大都不會均勻，最好是改變方向。


我的經驗，如果稍有風力，就全面實行逆風播種或施肥，但必須先認清距離，向前一撒，非常均勻，作物從播種到收穫一段過程，就不會發現有的過於茂盛，有的肥份不夠。(桃園縣楊梅鎮水美里十鄰八號林金璋)



左農璋金林

9六-19

欲增加收穫
先從土壤消毒！
西瓜蔓割病等
土壤病害之特效藥



新土壤殺菌劑〈農藥字第237號〉

シニルトン

施美農

100cc·500cc

西瓜、胡瓜、番茄等蔬菜以及菸草、鐘麻等之農作物為種々土壤病害所侵襲、而受到莫大之損害、以前要防除這種損害、却苦無適當之農藥、現在日本三共已製造出新的土壤殺菌劑〈施美農〉。效用卓著可以安心了。

- 〈施美農〉為最新型土壤殺菌劑、灌注土中該藥能逐漸滲透土壤。
- 在土中其接觸殺菌力及蒸氣殺菌力非常優良、故其對土壤病害之消除有確實之效果！
- 因其藥害很少、如適當應用、並可用於生育期間之農作物。

總經銷處 裕隆商行
台中市建國路 167號

日本·東京
三共株式会社
台灣總代理
中國化學製藥股份有限公司

