

# 曲友紅驗

## 甘藷增產可施調合肥

我種了一分三厘地甘藷，施了堆肥四千臺斤做基肥，經兩週後，再施硫安三十臺斤，過磷酸石灰五十臺斤，作第一次追肥。第二次再經過兩週後施下蔗農服務社經銷的三號調合肥每包五十公斤兩包，施用後經過一個月，甘藷蔓生育茂盛，到收穫時每個甘藷的重量平均約兩臺斤，共收穫六千臺斤，時價每百臺斤三十九元，售價為二千三百四十五元，除肥料費三百七十元，盈餘得一千九百七十九元，比較同一成本而全用化學肥的增收百分之六十，可見三號調合肥是一種很好的肥料，對甘藷的增產確實有很大的效果。（彰化縣埤頭鄉陸嘉村中華路十六號蔡森）

## 噴用農藥切記要適當

把握適當的時期：例如低溫多濕時要噴藥預防稻熱病；高溫多濕時防蠨蟲，更應該在蠨蟻發生最高峰時開始噴藥。



左農業金林

我的經驗，如果稍有風力，就全面實行逆風播種或施肥，但必須先認清距離，向前一撒，非常均勻，作物從播種到收穫一段過程，就不會發現有的過於茂盛，有的肥份不夠。（桃園縣楊梅鎮水美里十鄰八號林金章）

噴藥時間要準確：氣溫高噴藥，作物易受藥害；人又容易中毒；藥劑也容易受陽光照射分解失效。所以噴藥時間最好能選擇陰天或下午二點以後較適當。

必需能對症下藥：如「巴拉松」的使用範圍雖然很廣泛，但不見得對一樣害蟲有很好的效果。例如防治黑椿象，「巴拉松」就不如「賽文」，「BHC」或「安特靈」等有效。


## 播種施肥逆風較平均

噴藥部位要恰當：如為防治蚜蟲、蠐螬等應該噴射在葉的背面，才收到事半功倍的效果。

藥液份量要充足：各種藥液濃度，要依作物生育期的不同而改變，植

愈多。但也不能隨便提高濃度而受藥害。如「阿蘇仁」是很貴的藥劑，通常兩千倍就能生效，又何必

**欲增加收穫  
先從土壤消毒！  
西瓜蔓割病等  
土壤病害之特效藥**



新土壤殺菌劑（農業字第237號）

# シミルトン

施美農

100cc・500cc

西瓜、胡瓜、番茄等蔬菜以及菸草、鐘麻等之農作物為種々土壤病害所侵襲，而受到莫大之損害，以前要防除這種損害，却苦無適當之農藥，現在日本三共已製造出新的土壤殺菌劑（施美農）。效用卓著可以安心了。

- 施美農為最新型土壤殺菌用水銀劑，灌注土中該藥能逐漸滲透土壤。
- 在土中其接觸殺菌力及蒸氣殺菌力非常優良，故其對土壤病害之消除有確實之效果！
- 因其藥害很少，如適當應用，並可用於生育期間之農作物。

總經銷處 裕隆商行  
台中市建國路 167號

日本・東京  
三共株式會社  
台灣總代理  
中國化學製藥股份有限公司