



水稻新種尚在示範

【問】：一、水稻農林六五十一A和臺中一七八號那一種較抗風？
【答】：一、農林六五十一A，在第二期作是中熟性，第一期作屬晚熟性，自本第二期作起在各地示範，尚未推廣。抗風性要等本期示範後才可明白。(林吉明)

香茅割太長有害

【問】：一、香茅刈刈時，究竟從葉梗那一部份割取最好？
二、蒸香茅煎草在蒸器內時，讓說越緊出油較多，有的人說過緊了油不易蒸乾，反會影響整個收油量，究竟怎樣好？

【答】：一、香茅葉鞘部含油很少，割得太長有害無益，應儘可能留下。一般約在地上部二十公分處割取為適。
二、香茅草如晒得很乾，放進鍋發時可以儘量壓緊，油分可蒸盡。如草還濕，或受雨淋後表面有水就不宜壓太緊，否則蒸汽有大部分不能達到，油分不能蒸出。又蒸氣強的可感緊；弱的不宜過緊。(劉富文)

改良場有簡易乾燥箱

【問】：一、何處有簡易乾燥箱？
二、省製多翼式送風機，何處有售？
(花蓮縣新城新城市新街二一七八號龍成)

九月下旬播愛家豆

【問】：一、本地區排水不良的土壤，種何水稻品種較宜？
二、二期作收穫後欲播種不根豆(大豆)請問前後作的播種適期和品種。(臺南縣六甲鄉中社村港子頭十七號莊進發)

【答】：一、土壤肥的栽培臺南一號，較瘠的地方可栽培臺南三號。
二、水稻品種以臺南一號或嘉南八號為宜，但為考慮種植禾根豆關係插秧適期宜在七月下旬。禾根豆品種可用臺大高雄一號至七號，百美豆，愛家豆等。播種適期為九月下旬至十月中旬。(莊商路)

金龜子會吃荔枝葉

【問】：荔枝正在發芽時期。發現有金龜子，吃荔枝嫩葉。請問用什麼藥防治？(苗栗縣苑裡鎮上館里四十六號蕭良貴)

【答】：一、每到春夏季會出現銅綠金龜子，食害各種植物葉和花。卵產在土中，幼蟲在土壤中為害農作物的根部。一年發生一代。
二、防治法是在露水未乾時撒佈DDT粉在葉上，如因樹高可用紗布或蚊帳布包葉粉掛在竹桿上振動施藥，施藥後要三星期才可以採果。(張長傳)

自留什交種並無價值

【問】：蕃茄和香瓜的一代什交種栽培後已採種，可否仍稱一代什交種？(花蓮縣玉里鎮長良八一號陳和平)



【答】：蕃茄和香瓜，一代雜種不可留種，如留第一代雜種的種子稱為第二代雜種，第二代雜種除蕃茄外，其他雜種都會分離，分為多型雜種，品質相差不一，並無價值。(王進生)

農友們的好消息!!

豐盛種子行，專誠為農友們服務!!

敝行專營親自繁殖改良，交配優良之各色蔬菜種子，雜穀，山產，農藥，及直接選辦外國種商社進口之優良種子，價廉物美，絕對信用可靠，專門為農友們服務，懇請倍加愛顧，並祈駕臨指導，無任歡迎!!

價目表 函索即寄

豐盛種子行

嘉義市中正路五一四號 電報掛號：〇三八五號 郵劃嘉字八〇九六〇號

農友們 種植瑞典燕菁

請向敝公司購買優良可靠的種子，相信聰明的顧客一定不會貪圖一時的便宜而採買較廉的種籽，種籽的價錢相差不多，但種籽的優劣是您成功與失敗的關鍵，敝公司的種籽已有去年度優良豐收的實績可使您放心，更加可保證您一定不會吃虧，一定可以增加收益，紫色瑞典燕菁，青色瑞典燕菁均備。

蘆筍——一五〇九號，美麗華盛頓現貨可供每磅一九五元

中早生甘藍，脫普甘藍，USM一號甘藍，孢子甘藍，藤田五寸人參，美國大型五寸人參，黃肉餉料蘿蔔，紫紅結頭菜，紅高麗菜，包心萵苣，各種交配蕃茄及日本、美國各種秋時種籽全部入貨歡迎賜顧。

臺灣農產企業公司 臺灣農業資材公司

臺北市迪化街一段八十六號 電話：四四二二五三號 劃撥儲金臺灣一二七九九號

秋季蔬菜種 籽價格表函索即寄



枇杷施肥要在花蕾形成後

【問】：一、爲了怕風，用繩把枇杷緊綁在竹桿上，中間隔條皮有無影響？
二、颱風後，大部份葉子發軟下垂而枯死是何原因？

三、枇杷應如何施肥？(臺中縣后里鄉墩西村四村路四十三號侯純禮)

【答】：一、爲避免風害，設置果園必須選擇避風位置，同時種植防風樹，然後再用支柱才有效。
二、樹幹和支柱的中間隔着一層橡皮用繩細縛緊，可減少樹皮受損，不致有其他不良影響。

三、枇杷在花蕾形成後施用有機肥料一次，如在花蕾形成前施肥，反將促進新枝發育而減少開花，應予避免。
果實採收後可施化學肥料一次。枇杷適合土層深厚排水良好的砂壤土或粘壤土。

在開花結果期間不宜缺水，陽光不宜過強，氣溫宜低。適於中部六百至一千公尺地區栽培。
果實發育期間氣溫過高時，可使果實提早成熟，因而果形減小，影響品質。(張振宙)

印度粟不結果定有原因

【問】：據種商說印度粟種了一年後可開花結實，實際上種了二、三年後開花多而不結果如何改善？(嘉義市光彩街三八七號丁水來)

【答】：印度粟實生苗已經一年，的確可以開花。種植二、三年後開花多不結果的原因，可能和發育不良有關，如陽光不足，土壤排水不良，營養缺乏和病蟲爲害等。

又幼齡樹開花後常因花粉和胚珠發育不正常，花多脫落，也是結果少的重要原因。(張振宙)

西印度櫻桃四年結果

【問】：一、西印度櫻桃宜如何栽培？有何營養價值？
二、西印度櫻桃，色香雖好但很酸，有何推廣價值？

三、西印度櫻桃經幾年可結果？(彰化縣竹塘鄉小西村二號林尊倫)

【答】：一、西印度櫻桃需高溫，陽光充足，排水良好等條件，需多施有機肥料，氮肥不可太多，發育旺盛期間不可修剪。是現在所知水果中含丙種維生素最多的一種。

二、西印度櫻桃很酸，現在嘉義農業試驗分所已選出一甜味種，食味比較可口。這種果實採收後很容易腐爛，不能在市場銷售，所以沒有經濟價值。祇適合庭園栽培，供給日常生果爲目的。

四、西印度櫻桃的生苗栽培後需經過四年後方開始結果。(張振宙)

農藥可向農會購買

【問】：一、何處買阿特靈粉較好？
二、有配好的藥劑可出售否？
三、自配的方法如何？(臺東縣達仁鄉孫江海)

【答】：一、「阿特靈」可濕性粉最好向當地農會購買，如農會無貨，可請求農會或鄉公所直接向工廠如嘉義市信義路三七號民豐化工廠或臺中縣大里鄉內新路興農化工廠批購，每包一·二五磅約四十五元。
二、賜保根或西樂生也可向農會購買，一百公分局約五元。誘殺毒餌的「蟋蟀螞蟧毒餌」，臺中縣霧峰鄉正豐化學公司有配好的成品。
三、如要自配毒餌可用BHC或DDT或飛佈達粉或阿特靈粉當毒劑。

(張良傳)



- 巴拉松乳劑，樂果乳劑
- 馬拉松乳劑，立農松乳劑
- PM 乳劑，巴靈乳劑
- 蔬菜乳劑，展着劑
- 石灰硫磺合劑
- DDVP 乳劑
- 安特靈乳劑



立農化學工業股份有限公司

地址：臺北市太原路57號3樓
電話：41108 41246
工廠：臺北縣士林鎮廣雅里32號之3

員林：美豐農藥行 何阿麻 員林鎮中正路192號
電話：員林779
南部總經理：翁博如 嘉義縣義竹鄉六桂村199號
年豐農藥行 電話：義竹周24號
屏東：聯豐行 翁博裕 屏東市民生路194號
電話：1959號

經銷處：

羅東：大方農畜藥房 張淮彬 羅東鎮中山西路52號
電話：415
臺中：臺中聯裕處 江振通 臺中縣大雅鄉民生路67號
萬有西藥房 張紹銓 臺中縣豐原鎮市前街101號
電話：豐原485
南投：輝豐行 張錫農 南投鎮中山街125號
電話：南投185



要學接木

函詢中興大學

【問】：一、水蜜桃和母樹接木？

三、在何地可學習接木？(臺中縣清水鎮高美甲護岸路廿四號洪秋芬)

【答】：一、水蜜桃接木可用苦桃。日本梨的接木，各用什麼做母樹接木？

二、前面兩種母樹用種子，何處出售和價格如何？

三、要學習接木，可到中興大學農學院果樹園藝研究室接洽。(朱長志)

番茄放室內可促進着色

【問】：一、海拔兩千公尺山地，可否種番茄？去年試種結果還好，但久不成熟，顏色帶綠，是否可以採收？

二、梨山可否種蘆筍？(臺中市練武路二二九巷六弄十七號何積道)

【答】：一、海拔兩千公尺的山地如欲栽培蕃茄，在育苗時應用塑膠布保溫育苗後，等氣溫上升到攝氏十五度以上時定植本圃。如果等氣溫上昇在室外可育苗時，因時季過遲，在蕃茄成熟期易受低溫影響，若果成熟都不好，久不成熟可放室內，促進着色。

二、梨山交通不便無加工廠，不宜種加工用蘆筍。(王進生)

蘆筍老莖要分次淘汰

【問】：去年所種蘆筍約五分地，今年二月間，開始採收時產量很好，但最近的產量逐漸減少，而且筍株也變黃了，請問如何處理？(雲林縣張忠鄉新湖村四號吳安全)

【答】：一、母莖老化變黃是因為同化作用差，普通春二、三月所留的二、三枝母莖，經過三個月多的時間慢慢變黃，應在六月中再留新的母莖，分成幾次淘汰老母莖。

二、如需進一步明瞭蘆筍栽培的要訣，宜向臺灣農業服務社(郵政劃撥五一九九號)買一本蔬菜栽培法閱讀較詳。(王進生)

紅木耳比黑木耳好

【問】：一、栽培木耳後，發生黑斑和細小蟲類有何藥品可消除？

二、木耳品種何種較優良？(彰化縣芳苑鄉路平村路八號謝清記)

【答】：一、栽培木耳發生黑斑和細小蟲類，是因場地通風和整潔不良。溫度過高要清掃場地污物，把廢木搬出用清水洗淨，放在陽光下曝曬，在夏天約需四、五天後，把晒乾的廢木搬回栽培場繼續澆水，注意改善通風。病蟲害發生自然會減少。

二、木耳品種以紅木耳為優，售價較高，黑的次之，售價亦低。對抗熱和耐濕性，黑的較紅的為大。

蘆筍種子每磅百八十元

【問】：一、明年三、四月移植的蘆筍，最晚到什麼時候播種？

二、種植蘆筍每分地的種子量多少？

三、請代為調查蘆筍種子的價格。(嘉義縣六脚鄉蒜頭村一百五十五號黃水木)

【答】：一、打算明年三、四月定植的蘆筍，宜在今年九、十月間播種。最遲可到十一月中旬。

二、每磅種子可以育成五、六分地用的苗株，每分地約需苗株廿坪。

三、每磅種子約一百八十元。(王進生)

蘆筍春秋點播為宜

【問】：一、蘆筍播種，何時適當？

二、播種法和管理法如何？

三、蘆筍移植後如何施肥？


【答】：一、本省分為春季三、四月，秋季九、十月播種為宜。

二、最好用點播法，密度是十二公分×九公分，管理方法請參照本刊第十二卷第廿二期，蘆筍育苗技術的改進。

三、蘆筍的施肥，請向農林廳農業教育室索贈本省蘆筍栽培法參考。(王進生)



▲農友的大福音：在春夏秋冬四季均可下種各種品種：由二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，最新改良特選優良品種信用最可靠供應國內外農友可安心栽培請勿失良機敬請賜顧歡迎選購。



- ◎早生30天青粉菜結球白菜
◎新夏秋35天結球白菜
◎晚生黑葉結球白菜
◎早春35天結球白菜
◎特早理想夏高40天花椰菜
◎兩風早40天結球花椰菜
◎早生55天純白結球花椰菜
◎伊國青花菜
◎金銀早生甘藍
◎嘉隆二號早生甘藍
◎金門早生結球菜(蘿蔔)
◎北京結球菜
◎早生40天長種馬耳他菜頭
◎大白拉布天菜頭(蘿蔔)
◎頭州早50天長身菜頭：下種期：2月止。株距9寸×1尺。
◎交配種長身菜頭(蘿蔔)
◎60天長身冬瓜(蘿蔔)
◎其他各色品種應有盡有敬請選購，並各種農藥，肥料噴霧器等請參閱一九六四年新園藝栽培法，其內容詳細刊登在案，並請全省農友光臨指教。
◎敬告農友：敝行一九六四年新園藝栽培法已出版供應希望諸君附郵三元即寄
◎敬啟者：敝行為全省顧客專誠服務由一九六四年起，特派農業技術指導員按全省各地巡迴拜訪歡迎提供高見賜教是禱。

嘉義 清河種子行

嘉義市中正路四八二號 電話：三五八四號 劃撥儲蓄字號八〇〇三七