



**枇杷施肥要
在花蕾形成後**

【問】：一、爲了怕風，用繩把枇杷緊綁在竹桿上，中間隔條皮有無影響？
二、颱風後，大部

份葉子發軟下垂而枯死是何原因？

三、枇杷應如何施肥？(臺中縣后里鄉墩西村四村路四十三號侯純禮)

【答】：一、爲避免風害，設置果園必須選擇避風位置，同時種植防風樹，然後再用支柱才有效。
樹幹和支柱的中間隔着一層橡皮用麻繩縛緊，可減少樹皮受損，不致有其他不良影響。

二、幼苗中心空，呈現黑色，可能是先受蛀蟲爲害，且因蟲害引起腐爛。颱風吹襲後可能加重此等爲害的嚴重性，改使葉片提早凋萎。挽救的方法是平時注意預防病蟲害的爲害。

三、枇杷在花蕾形成後施用有機肥料一次，如在花蕾形成前施肥，反將促進新枝發育而減少開花，應予避免。
果實採收後可施化學肥料一次。枇杷適合土層深厚排水良好的砂壤土或粘壤土。
在開花結果期間不宜缺水，陽光不宜過強，氣溫宜低。適於中部六百至一千公尺地區栽培。

果實發育期間氣溫過高時，可使果實提早成熟，因而果形減小，影響品質。(張振宙)

印度粟不結果定有原因

【問】：據種苗商說印度粟種了一年後可開花結實，實際上種了二、三年後開花多而不結果如何改善？(嘉義市光彩街三八七號丁水來)

【答】：印度粟實生苗已經一年，的確可以開花。種植二、三年後開花多不結果的原因，可能和發育不良有關，如陽光不足，土壤排水不良，營養缺乏和病蟲爲害等。

又幼齡樹開花後常因花粉和胚珠發育不正常，花多脫落，也是結果少的重要原因。(張振宙)

西印度櫻桃四年結果

【問】：一、西印度櫻桃宜如何栽培？有何營養價值？
二、西印度櫻桃，色香雖好但很酸，有何推廣價值？
三、西印度櫻桃經幾年可結果？(彰化縣竹塘鄉小西村二二號林尊倫)

【答】：一、西印度櫻桃需高溫，陽光充分，排水良好等條件，需多施有機肥料，氮肥不可太多，發育旺盛期間不可修剪。是現在所知水果中含丙種維生素最多的一種。
二、西印度櫻桃很酸，現在嘉義農業試驗分所已選出一甜味種，食味比較可口。這種果實採收後很容易腐爛，不能在市場銷售，所以沒有經濟價值。祇適合庭園栽培，供給日常生果爲目的。
四、西印度櫻桃的生苗栽培後需經過四年後方開始結果。(張振宙)

農藥可向農會購買

【問】：一、何處買阿特靈粉較好？
二、有配好的藥劑可出售否？
三、自配的方法如何？(臺東縣達仁鄉孫江海)

【答】：一、「阿特靈」可濕性粉最好向當地農會購買，如農會無貨，可請求農會或鄉公所直接向工廠如嘉義市信義路三七號民豐化工廠或臺中縣大里鄉內新路興農化工廠批購，每包一·二五磅約四十五元。
二、賜保根或西樂生也可向農會購買，一百公份約五元。誘殺毒餌的「蟋蟀蟻蝨毒餌」，臺中縣霧峰鄉正豐化學公司有配好的成品。
三、如要自配毒餌可用BHC或DDT或飛佈達粉或阿特靈粉當毒劑。



巴拉松乳劑，樂果乳劑
馬拉松乳劑，立農松乳劑
P M 乳劑，巴靈乳劑
蔬菜乳劑，展着劑
石灰硫磺合劑
DDVP 乳劑
安特靈乳劑



立農化學工業股份有限公司

地址：臺北市太原路57號3樓
電話：41108 41246
工廠：臺北縣士林鎮廣雅里32號之3

員林：美豐農藥行 何阿麻 員林鎮中正路192號
電話：員林779
南部總經理：翁博如 嘉義縣義竹鄉六柱村199號
年豐農藥行 電話：義竹周24號
屏東：聯豐行 翁博裕 屏東市民生路194號
電話：1959號



經銷處：

羅東：大方農畜藥房 張淮彬 羅東鎮中山西路52號
電話：415
臺中：臺中聯裕處 江振通 臺中縣大雅鄉民生路67號
萬有西藥房 張紹銓 臺中縣豐原鎮市前街101號
電話：豐原485
南投：輝豐行 張錫農 南投鎮中山街125號
電話：南投185