

函詢中興大學

二、前面兩種母樹用種子，何處出售和價格如何？

【答】：一、水蜜桃砧木可用苦桃。日本梨砧木（接本）可用烏梨。

二、苦桃種子可到員林永靖苗圃訂購。烏梨種子最好到新竹縣關西鎮南和里六十四號彭登球先生洽購。價格每年不同。

三、要學習接木，可到中興大學農學院果樹園藝研究室接洽。（朱長志）

番茄放室內可促進着色

【問】：一、海拔兩千公尺山地，可否種蕃茄？去年試種結果還好，但久不成熟，顏色帶綠，是否可以採收？

二、梨山可否種蘆筍？（臺中市練武路一二九巷六弄十七號何積道）

栽培蕃茄，在育苗時間應用塑膠布保溫育苗

後，等氣溫上升到攝氏十五度以上時定植木間。如果等氣溫上昇在室外可育苗時，因時季過遲，在蕃茄成熟期易受低溫影響，著果成熟都不好，久不成熟可放室內，促進着色。

二、梨山交通不便無加工廠，不宜種加工用盛筍。(王進生)

蘆筍老莖要分次淘汰

【問】：去年所種蘆葦約五分地，今年二月間，開始採收時產量很好，但最近的產量逐漸減少，而且筍株也變黃了，請問如何

處理？（雲林縣張忠鄉新湖村四號吳安全）

【答】：一、母莖老老化變黃是因為同化作用差，普通春二、三月所留的二、三枝母莖，經過三個多月的時間慢慢變黃，應在六月中再留新的母莖，分成幾次淘汰老母莖。

二、如需進一步明瞭蘆筍栽培的要訣，宜向臺灣農業服務社（郵政劃撥五一九九號）買一本蔬菜栽培法閱讀較詳。（王進生）

【問】：一、栽培木耳後，發生黑斑和

蟲類有何藥品可消除？

二、木耳品種何種較優良？（彰化縣芳路平村路平路八號謝清記）

【答】：一、栽培木耳發生黑斑和細小，是因場地通風和整潔不良。溫度過高

掃場地污物，把段木搬出用清水洗淨，陽光下曝曬，在夏天約需四、五天後，

通風。病蟲害發生自然會減少。

的次之，售價亦低。對抗熱和耐濕性，較紅的爲大。

【問】：一、月半三、四月多直約蘆筍

最晚到十點時突然加重？

二、種植蘆筍每分地的種子量多少？

【答】：一、打算明年三、四月定植的

，它在今年九、十月間播種。最遲可至
月中旬。

二、每份種子可以育成五、六分地的，每分地約需苗床廿坪。

三、每畝種子約二百八十元。(王進生)

【問】：一、蘆筍播種，何時適當？

三、蘆筍移植後如何施肥？

【答】：一、本省分爲春季三、四月，

分，管理方法請參照本刊第十二卷第廿二、最好用點撥法，密度是十二公分×

三、蘆筍的施肥，請

林麝鹿業教育室索贈
盧衍栽培法參考。(生)



嘉義
清河種子行

▲農友的大福音：在春夏秋冬四季均可下種各種品種：由二代七十餘年之經驗蔬菜種子專家，最新改良特選優良品種信用最可靠供應國內外農友可安心栽培請勿失良機敬請賜顧歡迎選購。
 下種期：7月上旬至9月下旬止。
 白菜：每粒中重三五斤以上。
 二號早生黑菜結球白菜：每粒中重三五斤以上。

鳳山改良短種菜頭
 阿山黑菜菜頭
 正河改長花春菜頭
 清河改長果麗托
 新玉黃香瓜(梨仔瓜)
 青皮大長湖瓜
 竹山刺瓜
 節瓜(毛瓜)
 木瓜形南瓜(金瓜)
 蘇魯大苦瓜
 粉白大型冬瓜
 牛腿飽(日飽)
 赤菜大包心芥菜(三號)
 雲南大頭菜
 帝國二號結球高豆
 紅仁白夾二尺半菜豆
 臺北二號黑性菜豆
 臺北二號黑性菜豆
 清河改良花仁皇帝豆
 新產品花仁皇帝豆
 早生60天硬白結晶花椰菜
 早生60天長葉純硬白結晶花椰菜
 早生70天長葉純硬白結晶花椰菜
 中生晚雪白結晶花椰菜
 正晚生白結晶花椰菜
 新產品晚生雪白大花椰菜
 中晚赤葉結晶雪白花椰菜
 中晚晚生雪白花椰菜
 正晚生白結晶花椰菜
 新產品晚生雪白花椰菜

日本黑葉美濃早生菜頭(蘿蔔)
 美國紅心五寸人參
 美國紅心五寸人參
 美國紅心五寸人參
 龍野川大長人參
 日本關交配一號甘藍
 海谷三池仲生甘藍
 サクセツヨン黃菜系甘藍
 島山關交配大腳菜
 長關交配二號二號二號
 新關交配二號二號二號
 媽娜西二號二號二號
 媽娜西二號二號二號
 美國新種紅粉色二號二號
 相國北二號二號二號
 全年開花大粒甜椒
 美國加州大粒甜椒
 正島枝麻之長茄
 早生黃葉白骨芹菜
 正晚生白葉白骨芹菜
 正晚生白葉白骨芹菜
 新理想牛高脚波蔴菜
 新理想牛高脚波蔴菜
 新理想牛高脚波蔴菜
 日本改良白菜
 日本改良白菜
 日本改良白菜

其他各色品種應有盡有敬請選購，並各請農友光臨指教。
 ◎敬告農友：敝行爲全省顧客專誠服務由一九六四年起，特派農業技術指導員按全省各地巡迴拜訪歡迎提供高見賜教是禱。