

蒸氣消毒

使用蒸氣消毒器，可以洗刷和消毒同時進行。一般農家是不會有這種消毒器的。可以在洗刷後，用攝氏八十度以上的熱水，撥在豬欄內地面和牆壁上消毒。如能同時加添克來蘇肥皂液或鹼，效果更好，可以殺滅病原菌、寄生蟲卵和外寄生蟲。

火焰消毒

使用噴火機，噴射火焰，讓火焰的熱度，燒灼附着在豬欄上的病原菌、寄生蟲卵和外寄生蟲等。噴火器是燒煤油的。最小型的噴火器，火焰的熱度可達一千度以上，離地一尺半也有一百度。是最好的消毒方法，可惜費用和時間都不經濟。

飼養火雞要點

李登元

飼養過火雞的農友們，都會感覺到初生的火雞雛特別難養，本篇提供你幾點最需要注意的地方。

怎樣叫做餓餓死亡

預防餓餓死亡：剛孵出的初生雛，常常因為無法啄食飼料，餓餓而死亡。這種情形無法預防或醫治，祇有在管理上注意下面的幾點：
(1) 當火雞孵出後，應立即供應充份的飲水和飼料。開頭幾天，可在厚紙上，或是平面的木盤裏，撒下飼料，使雛雞容易吃到。因為有許多初生雛的餓死，是由於吃不到飼料，啄吃墊草而致死的。

如果育雛器的四週是應用鐵絲網或木條做的，就可預防這種弊病。

(2) 每天所餵的飼料，量要少而時常加，可以保持飼料的清潔衛生，而且可吸引雛雞就槽啄食，避免去吃墊草。

(3) 飲水器或飼料槽不清潔的應隨時清除，每天至少清除一次，務使清潔乾淨。

如何運用混合飼料

火雞雛應用完全的混合飼料，通常在十至十二週齡內的火雞雛，應用中等大小的小粒餌，十二週齡後的可應用較大的完全小粒餌。

飼料的消耗量，要看環境條件和雛雞上市時大小的不同而異。

現在以廣胸白色公火雞為例：

兩週齡時，如果每只平均體重是〇・四三磅，則一千隻的飼料量要五百八十磅。

八週齡時，如果每隻平均體重四・五磅，則一千隻的飼料量要一萬另百磅。

十六週齡時，如果每隻平均體重是十三・七磅，則一千隻的飼料量要四萬二千磅。


如果是母雞的話消耗飼料要比公的少些。飼料中最主要的成分是蛋白質，火雞年齡愈大，所需蛋白質的含量愈少，也就是說，在幼雛時期，需要蛋白質量特別高。例如普通雞隻，在幼雛時期蛋白質的含量約需百分之二十。所以我們要火雞雛生長良好，必需根據發育的情形，特別注意它們蛋白質的需要量。



，用作起下打針一
，痛頭心流直汗冷
，去落倒支不狗阿
！懂不弄手助聞老



，大情事人命了出
，查調來人察望
？射該應不聞老
注兼能那藥費



，生醫認愛大友農
，藥找我病應生不
！便成該吃隨可
，方又全安院醫