




## 抱子甘藍需量少 目前勿大量栽培

(一)貴刊十四卷十一期二七頁刊出的抱子甘藍種子，何處有售？

(二)栽培管理及收穫施肥的方法請詳細說明。(新竹關西鎮陳永枝)

答：(一)抱子甘藍種子可向臺灣農產企業公司洽購，以長岡交配早生種為好。目前抱子甘藍的銷路尚未展開，不可大量栽培，等製罐外銷成功後，才可大量栽培。

(二)抱子甘藍栽培法和甘藍大略相同，但株行距以五〇×七〇公分為宜，每十公畝施肥量較甘藍多五成。其他管理和病蟲害防除與甘藍相同。抱子結球緊密，達到大拇指以上的大小，即可收穫。(王進生)

## 日光晒死病菌 防治木耳病害

近年來，本省農村栽培木耳的風氣很盛，但是由於管理不得法，常常

在正當盛產木耳時，感染腐敗病而減產。發病嚴重的，全部木耳腐敗，栽培者束手無策，損失慘重。

### 原因

木耳腐敗病，常在栽培後五至六個月間，發生原因是菇舍過份潮濕，通風不良。在這種環境下，腐敗病菌容易產生，並寄生於木耳上，使木耳腐爛。

### 病徵

不論幼生木耳或老熟木耳，都能被腐敗病菌寄生而腐敗。最初，木耳呈淺水狀，變色，表面具有粘液，在樹木上木耳間呈現金黃色的網狀物，繼續蔓延，木耳倒伏，腐爛如膠狀，然後漸漸消失。

### 防治

(1)發現木耳腐敗病時，使菇舍乾燥，並使通風良好。  
(2)取出有病樹木，放置在通風良好處，陰乾了四天後，再移入菇舍。  
(3)發病嚴重的樹木，應把發病部位削去皮部，陰乾幾天後再移入菇舍。或直接放在太陽下，曝曬到樹木表皮乾燥後，再移入菇舍亦可。  
(4)清潔菇舍，驅除白蟻或蟻蟻。(師銘)

## 配售純種北平鴨

今年四月間，農林廳自美國引進的一批純種北平鴨種鴨，現在高雄區農業改良場飼養發育良好。除了留作種鴨外，尚有母鴨八十五隻，公鴨一百四十隻，可以賣給農友們飼養。

有興趣的農友們，請直接寫信向「高雄縣鳳山鎮和德里中山路四巷十五號高雄區農業改良場畜牧課」洽購。(之屏)

臺灣省農林廳農藥登記證農藥字第 381 號

最新水稻紋枯病驅除用液劑

**ネオアゾジ<sup>®</sup>**

新阿蘇仁液劑

製造元：日本イハラ農藥株式會社

進口商：靜興企業有限公司

地址：臺北市承德路83號三樓 電話：51023 52023

◀現貨供應▶ 年豐農藥行

嘉義縣義竹鄉六桂村 199 號

▲使用イハラ農藥可使你年年豐收▼



日本原裝