



如何栽培 加工豌豆？

堂錦王

近年來，國際市場上，加工和冷凍蔬菜需要量年年增加。本省可利用秋冬冬季水稻製作，栽培加工豌豆，供加工製罐和冷凍輸出，爭取外匯。

臺中區農業改良場，直接從外國引進的加工豌豆品種，經過兩年來的試驗結果，已經選出適宜於本省各地栽培的優良品種。本篇是介紹它們的特性和栽培法。農友們如果需要這種種子，可趕快向種苗繁殖場，雲林縣農會，大甲鄉農會，或臺中改良場接洽。

品 種 百富 (Perfection) 優良罐頭用品種，植株矮壯，抗病力強。雙

莢，莢大而美觀整齊，形稍彎而尾端鈍。莢長七·五公分，寬一·三公分，厚一·一公分，每莢含有七至九粒豆仁。

青豆徑〇·八公分，種子色綠，種皮皺縮，白臍，每千粒種子重約一百六十分。收穫期是七十

至一百二十天，屬稍晚生種。

罐王 (Canner King) 品質高尚，為優良罐頭用品種，植株稍大。抗病力強，雙莢或單莢，莢大而整齊，形稍彎而尾端鈍。莢長八·五公分，寬一·五公分，厚一·三公分，每莢含有七至九粒豆仁。

青豆粒徑一公分。種子色綠，種皮皺縮，白臍。每千粒種子重約二百二十公分。收穫期是六十七至一百二十天，也是稍晚生種。

風 土

豌豆的栽培範圍，寒、溫、熱三帶都可以。對於低溫的抵抗力很強，輕微凍結易恢復，惟花器弱容易不結莢，又忌高溫。在生長期中需稍濕，但到收穫期，以雨量少而乾燥的氣候為適當。

土質以肥厚而通氣，排水良好的粘質土至砂質壤土為佳。河床上含有適當濕度的砂土亦很理想。

豌豆忌連作，但種其他豆科就沒有關係。土壤反應的適當酸度是五·五至六·八，所以強酸性土壤不宜栽培，否則需要施用石灰中和。

肥 料

豌豆種在肥沃的土壤上，無需施肥。但為增加單位面積產量，可依土壤的肥瘠程度，適當的配合施用。一般較瘠土地，每十公畝可施用硫酸銨二十公斤，過磷酸鈣五十公斤，氯化鉀三十公斤和堆肥一千二百公斤。如果是較肥的土地，三要素都應適量的減少，並忌單用氮肥。


施肥時，把基肥（即堆肥）和過磷酸鈣全量及硫酸銨、氯化鉀各半量，在播種前一次混合施用。其餘硫酸銨和氯化鉀半量，在播種後二十天作追肥。糊仔栽培的，除堆肥兼做覆蓋用外，都在水稻收割後立即施用。

播 種

播種適期北部是九月下旬至十一月上旬，南部十月上旬至十月下旬。每十公畝需種子五至六公斤，播種前和「賜保根」二十公分拌種消毒。

糊仔栽培時，每隔水稻三、四行撥開做株行，


請認明牌子



豐收可靠的秘訣請使用

施 葉 養 元

(シオヤゲン)



綜合微量要素葉面敷布劑

1. 本劑是化學肥料，並非植物荷爾蒙劑。
2. 本劑比其他類似品，品質特殊。
3. 用本劑不但豐收，可預防各種病害。
4. 本劑可與各種殺蟲劑混合使用。
5. 本劑不可與石灰硫黃合劑之鹼性高強農藥混合使用。

請將使用本劑後之實際情形賜教於敝公司者另備贈品贈送。

水稻、麥、瓜類、菸葉、豆類、茶葉、洋菇、葡萄、蘆筍、玉蔥、花、薄荷、蔬菜類、各種果樹類等。

育成健苗 促進發育
預防病害 提高品質
加強着花 防止落果
提高糖分 保持鮮度
提早收成 增加收量

技術：日本液肥株式會社
製造：協和化學工業股份有限公司
臺北市華陰街39號

(シオヤゲン本舖)
(全省各農藥行均有售)
電話 4 6 9 8 0

並且每隔水稻一株作株距，在水稻收穫前十五天以內播種。播種穴宜用特製鑿穴器打孔，深六至九公分，但要依照土質及是否整畦而不同。每穴播種四至七粒，然後覆蓋少許腐熟堆肥。

管理

豌豆播種前後，應注意水份，保持適度為宜。浸水的害處很大，過濕時應設法排水。普通翻耕播種，應在播種前先灌溉，等土壤潤濕後播種。整地作畦栽培的，可播種後才灌溉。缺株應隨時補播。

除草工作宜及時進行，並在生育盛期前停止，又禁忌翻蔓，避免折斷植株。久旱時宜酌予灌溉，或配合追肥施灌液肥，供給水分幫助發育。

收穫

豌豆的生育，受氣候環境的影響很大，南部較快而北部較慢。在豆莢飽滿而尚未黃熟前採收，每隔三、五天便要採收一次。

興農飼料蘿蔔

它比任何品種，維他命高百分之二十(可節省許多高貴的飼料)栽培瑞典燕菁者，請願種此品種比較，比較！

農友們！增加你的收入，現貨供應美、日、各國種子已陸續進口了歡迎照會。

詳細請閱一九六四年秋季興農園藝新知識函索付郵二元即寄

輸入元 林興農行股份有限公司

本行 農種子行

電話：九七一一二六三〇八號
劃撥儲蓄金四〇二二一八號
豐原鎮中山路二八二之一號

加工豌豆是利用青豆仁，莢殼很粗糙，不能供食用，每十公畝可產青豆仁三百五十至四百三十公斤。

病蟲

白粉病，用可利生一千倍液防治。白絹病，用西綠生二千倍，銹病用大生四百倍液防治。夜盜蟲，用百分之二十五 DDT 乳劑五百倍液防治。葉潛蟲、豆潛蠅、蚜蟲，用百分之五十馬拉松乳劑八百至一千倍液防治。其他病蟲，酌選特效藥，在生育期間，每隔七至十天撒佈一次，至開始採收時停止。



種植

根據以往的三年栽培成績，最好的是美國 B. E. P. Co. 公司所產的紫皮黃肉瑞典燕菁，也就是在美國作為蔬菜用的品種。

燕菁

青皮白肉種的產量不及紫皮黃肉的好。

一種，大概是瑞典燕菁(紫色)的輸入，但本省尚無所謂飼料用大型瑞典燕菁種子。

試驗結果，實即飼料用(甜)菜。據(缺硼病)及級蟲病。

在臺灣栽培。

至二十元，最好約幾位農友合購原封罐裝的，較為可靠。

後移植。肥培管理與種高麗菜相同，除蚜蟲發生外，不必噴藥。

不必煮熟，初期不習慣可能有拒食現象，可多滲一些精飼料拌和給飼，二至三天即習慣取食。

附註：臺中神岡鄉王俊治農友來信詢問瑞典燕菁的問題，農復會畜牧組黃嘉先生答覆。

紫皮 黃肉 最好

鳳山的特色種子!!



- ① 鳳山早生花椰菜：八至九月播。
- ② 鳳山中生花椰菜：九至十月播。
- ③ 鳳山晚生花椰菜：十月至十一月播。
- ④ 鳳山一號蕃茄：高球大果色美。
- ⑤ 鳳山媽媽里蕃茄：高球中果抗病力強。
- ⑥ 鳳山 D 號蕃茄：高球大果耐熟。
- ⑦ 農友一號甜瓜：豐產早熟質佳。
- ⑧ 農友二號甜瓜：形美均美。
- ⑨ 農友早生花菜：早熟豐產質美。
- ⑩ 新富小富光西瓜：比原富光豐產質佳。
- ⑪ 新富小富光西瓜：比原富光豐產質佳。
- ⑫ 新富小富光西瓜：比原富光豐產質佳。
- ⑬ 新富小富光西瓜：比原富光豐產質佳。
- ⑭ 新富小富光西瓜：比原富光豐產質佳。

鳳山農友種苗店

高雄縣鳳山鎮第二市場內 郵政劃撥臺灣二一九號