



如何栽培 加工豌豆？

堂錦王

近年來，國際市場上，加工和冷凍蔬菜需要量年年增加。本省可利用秋冬冬季水稻製作，栽培加工豌豆，供加工製罐和冷凍輸出，爭取外匯。

臺中區農業改良場，直接從外國引進的加工豌豆品種，經過兩年來的試驗結果，已經選出適宜於本省各地栽培的優良品種。本篇是介紹它們的特性和栽培法。農友們如果需要這種種子，可趕快向種苗繁殖場，雲林縣農會，大甲鄉農會，或臺中改良場接洽。

品 種 百富 (Perfection) 優良罐頭用品種，植株矮壯，抗病力強。雙

莢，莢大而美觀整齊，形稍彎而尾端鈍。莢長七·五公分，寬一·三公分，厚一·一公分，每莢含有七至九粒豆仁。

青豆徑〇·八公分，種子色綠，種皮皺縮，白臍，每千粒種子重約一百六十分。收穫期是七十

至一百二十天，屬稍晚生種。

罐王 (Canner King) 品質高尚，為優良罐頭用品種，植株稍大。抗病力強，雙莢或單莢，莢大而整齊，形稍彎而尾端鈍。莢長八·五公分，寬一·五公分，厚一·三公分，每莢含有七至九粒豆仁。

青豆粒徑一公分。種子色綠，種皮皺縮，白臍。每千粒種子重約二百二十公分。收穫期是六十七至一百二十天，也是稍晚生種。

風 土

豌豆的栽培範圍，寒、溫、熱三帶都可以。對於低溫的抵抗力很強，輕微凍結易恢復，惟花器弱容易不結莢，又忌高溫。在生長期中需稍濕，但到收穫期，以雨量少而乾燥的氣候為適當。

土質以肥厚而通氣，排水良好的粘質土至砂質壤土為佳。河床上含有適當濕度的砂土亦很理想。

豌豆忌連作，但種其他豆科就沒有關係。土壤反應的適當酸度是五·五至六·八，所以強酸性土壤不宜栽培，否則需要施用石灰中和。

肥 料


豌豆種在肥沃的土壤上，無需施肥。但為增加單位面積產量，可依土壤的肥瘠程度，適當的配合施用。一般較瘠土地，每十公畝可施用硫酸銨二十公斤，過磷酸鈣五十公斤，氯化鉀三十公斤和堆肥一千二百公斤。如果是較肥的土地，三要素都應適量的減少，並忌單用氮肥。

施肥時，把基肥（即堆肥）和過磷酸鈣全量及硫酸銨、氯化鉀各半量，在播種前一次混合施用。其餘硫酸銨和氯化鉀半量，在播種後二十天作追肥。糊仔栽培的，除堆肥兼做覆蓋用外，都在水稻收割後立即施用。

播 種

播種適期北部是九月下旬至十一月上旬，南部十月上旬至十月下旬。每十公畝需種子五至六公斤，播種前和「賜保根」二十公分拌種消毒。

糊仔栽培時，每隔水稻三、四行撥開做株行，



元 養 葉 施

(シオヤゲン)

綜合微量要素葉面敷布劑

水稻、麥、瓜類、菸葉、豆類、茶葉、洋菇、葡萄、蘆筍、玉蔥、花、薄荷、蔬菜類、各種果樹類等。

育 成 健 苗 促 進 發 育
預 防 病 害 提 高 品 質
加 強 着 花 提 高 糖 分
提 早 收 成 保 持 鮮 度
提 早 收 成 保 持 鮮 度



1. 本劑是化學肥料，並非植物荷爾蒙劑。
2. 本劑比其他類似品，品質特殊。
3. 用本劑不但豐收，可預防各種病害。
4. 本劑可與各種殺蟲劑混合使用。
5. 本劑不可與石灰硫黃合劑之鹼性高強農藥混合使用。

請將使用本劑後之實際情形賜教於敝公司者另備贈品贈送。

技術：日本液肥株式會社 (シオヤゲン本舖)
製造：協和化學工業股份有限公司 (全省各農藥行均有售)
臺北市華陰街39號 電話46980