

# 農業信

料結果情形不會差。  
 二、海拔過低因冬季氣溫高，故結果不良。  
 三、造林地如坡度不太大，海拔在三百公尺至一千公尺左右，可以造林。  
 四、今年梅子欠收，是因去年冬季過暖及早春乾旱為其主因。  
 (農林廳技術小組)

## 鳳梨種植後

兩年可收成

【問】：一、正常開英種鳳梨種由何處有售？

鳳梨種植後  
 鳳梨種由何處有售？  
 二、鳳梨苗是否以冠苗為最優？  
 三、自種植日起，多少

日可收？

四、種鳳梨之最適期何月？(屏東高樹鄉泰山村泉泰店柳樹青)

【答】：一、正常開英種種苗可向南投縣名間鄉新厝村六五號陳深江先生洽。

二、鳳梨繁殖普通均採用裔芽苗為多，但優良品種(正常用開英種)因裔芽發生少，亦多採用冠芽繁殖。冠芽苗栽植後之發育及結果，情形甚佳，且整齊。

三、鳳梨以八九月間栽植為多，栽植後第三年六至八月間可採收，故約需二十至廿四個月。

四、鳳梨栽植時期，秋植以七至九月間，春植以四至五月間為佳。(黃季春)

## 海拔過低

不宜種梅樹

【問】：一、老欖梅樹結果情形會不會差？  
 二、淺山梅子，結果不好是何因？



三、造林地是否可造梅林。  
 四、今年梅子欠收是何因。(臺中市民族路一四一號謝俊騰)


【答】：一、不太老梅樹，施以適量肥料，發育比盤克夏好。(張聯欣)

## 保護梨果·宜用紙袋

【問】：一、本人種植竹東大梨果皮粗而梨果未熟何因？有何辦法？

二、梨果受蟲害施何等農藥為理想。  
 三、梨果未熟已受蟲及蟲害用塑膠袋將梨果包覆是否理想。(彰化縣花壇鄉三春林後厝巷四十號顧明哲)

【答】：一、大梨果皮粗而梨果為黑星病或黑斑病之侵害，好速殺，波爾多液均可防治，將發芽噴一次，花落後噴一次，隔十日後再噴一次。  
 二、蟲害可用五多可濕性D D T粉四五倍溶液噴射，惟採收以前三十日內不可噴射果實。  
 三、套袋可以防鳥蟲之危害，但用塑膠袋不適宜，因不能通氣有損品質，宜採用紙袋。



## 杜洛克藍瑞斯

飼養管理簡章

【問】：一、杜洛克，藍瑞斯，二品種新豬種何處有買？  
 二、飼養管理怎樣。  
 三、頂雙溪母豬交配杜洛克公豬生產之子豬發育怎樣？(嘉義六脚鄉崩山村三十七號林清富)

【答】：一、杜洛克、藍瑞斯二個新品種一般農家如有需要飼養公豬，請託當地農會代介紹向臺灣糖種畜場洽。  
 二、新品種飼養管理與其他豬同樣。  
 三、頂雙溪母豬交配杜洛克公豬之仔豬，發育比盤克夏好。(張聯欣)

石灰硫磺劑已落伍 進步的柑農友使用可口ナ  
 可口ナ是獨一無二的可濕性水和硫磺劑


可口ナ是火燒柑、紅蜘蛛的特效藥！  
 銹病、象皮病

### 石灰硫磺劑的劣點

- ①易生藥害
- ②寒傷噴霧器
- ③不可與其他農藥混合使用
- ④有效期間短促僅約14~20日
- ⑤攜帶不方便

### 可口ナの優點

- ①全無藥害
- ②噴霧器可暢通無阻
- ③銅水銀劑以外之任何農藥均可混合使用
- ④有效期間悠長可達二個月以上
- ⑤攜帶方便



(原裝進口供應)

可樂農

可口ナ

日本兼商株式會社 榮譽出品  
 臺灣總代理 經華貿易股份有限公司  
 臺北市涼州街20號 電話：41206  
 (臺北市郵政信箱第1764號)  
 \*誠徵苗栗縣、臺南縣、臺東縣、花蓮縣代理經銷商

## 農友們

### 種植瑞典燕菁

請向敝公司購買優良可靠的種子，相信聰明的顧客一定不會貪圖一時的便宜而採買較廉的種籽，種籽的價錢相差不多，但種籽的優劣是您成功與失敗的關鍵，敝公司的種籽已有去年度優良豐收的實績可使您放心，更加可保證您一定不會吃虧，一定可以增加收益，紫色瑞典燕菁，青色瑞典燕菁均備。歡迎賜購。

北京劍葉結頭菜，紫色瑞典燕菁，青皮瑞典燕菁，美國青花菜苔，中早生甘藍，脫普甘藍，USM一號甘藍，抱子甘藍，藤田五寸人參，美國大型五寸人參，黃肉飼料蘿蔔，紫紅結頭菜，紅高麗菜，包心高莖，各種交配蕃茄及日本、美國各種秋時種籽全部入貨歡迎賜顧。中藥：紅花、澤瀉、當歸、種籽廉價供應。

秋季蔬菜種籽價格表函索即寄

臺灣農產企業公司  
 臺灣農業資材公司

臺北市迪化街一段八十六號  
 電話：四四二五三號  
 劃撥儲金臺灣一二七九九號