

# 農業技術



鳳梨種植後  
兩年可收成

【問】：一、正常開英  
種鳳梨種苗何處有售？  
二、鳳梨苗是否以冠苗  
為最優？

三、自種植日起，多少  
日可收？

四、種鳳梨之最適期何月？（屏東高樹  
鄉泰山村吳泰店柳樹青）

【答】：一、正常開英種苗可向南投  
縣名間鄉新厝村六五號陳深江先生洽。  
二、鳳梨繁殖普遍均採用匍匐芽為多，  
但優良品種（正常用開英種）因芻芽發生少  
，亦多採用冠芽繁殖。冠芽苗栽植後之發育  
及結果，情形甚佳，且整齊。

三、鳳梨以八九月間栽植為多，栽植後  
第三年六至八月間可採收，故約需二十至廿  
四個月。

四、鳳梨栽植時期，秋植以七至九月間  
，春植以四至五月間為佳。（黃季春）

海拔過低

不宜種梅樹

【問】：一、老欉梅  
樹結果情形會不會差？  
二、淺山梅子，結果

新豬種何處有買？  
二、飼養管理怎樣。  
三、頂雙溪母豬交配杜洛克公豬生產之後  
子猪發育怎樣？（嘉義六腳鄉崩山村三十七  
號林清富）

一般農家如有需要飼養公豬，請託當地農會  
代介紹向臺糖種畜場洽。

二、新品種飼養管理與其他豬同樣。

三、頂雙溪母豬交配杜洛克公豬之仔豬  
，發育比盤克夏好。（張聯欣）

三、造林地是否可造梅林。  
四、今年梅子失收是何因？（臺中市民  
族路一四一號謝俊騰）

【答】：一、不太老梅樹，施以適量肥

料結果情形不會差。

二、海拔過低因冬季氣溫高  
，故結果不良。

三、造林地如坡度不大，  
可以造梅林。

四、今年梅子失收，是因去  
年冬季過暖及早春乾旱為其主因  
。（農林廳技術小組）

保護梨果・宜用紙袋

【問】：一、本人種植竹東大梨果皮粗  
而裂果未知何因？有何辦法？  
二、梨果受蟲害施何等農藥為理想。  
三、梨果未熟已受鳥及蟲害用塑膠袋將  
後厝巷四十號顧明哲）


【答】：一、大梨果皮粗而裂果為黑星  
病或黑斑病之侵害，好速殺，波爾多液均可  
防治，將發芽噴一次，花落後噴一次，隔十  
日後再噴一次。

二、蟲害可用五%可濕性DDT粉四五  
○倍溶液噴射，惟

採收以前三十日內

不可噴射果實。

三、套袋可以  
防鳥蟲之危害，但



用塑膠袋不適宜，

因不能通氣有損品  
質，宜採用紙袋。

杜洛克藍瑞斯

飼養管理簡單

【問】：一、杜洛克，藍瑞斯、二品種  
新豬種何處有買？  
二、飼養管理怎樣。  
三、頂雙溪母豬交配杜洛克公豬生產之後  
子猪發育怎樣？（嘉義六腳鄉崩山村三十七  
號林清富）

秋季蔬菜種  
籽價格表函  
索即寄

臺灣農產企  
業資材公司

電話：四四二二五三  
臺北市延化街一段八十六號  
郵局：四四二二七九九號

農友們

種植瑞典蕪菁

**北美劍葉結頭菜，紫色瑞典蕪菁，青皮瑞典蕪菁，號甘藍，抱子甘藍，中早生甘藍，脫普甘藍，U.S.M.**  
請向敝公司購買優良可靠的種子，相信聰明的顧客一定不會貪圖一時的便宜而採買較廉的種籽，種籽的價錢相差不多，但種籽的優劣是您成功與失敗的關鍵，敝公司的種籽已有去年度優良豐收的實績可使您放心，更加可保證您。歡迎一定不會吃虧，一定可以增加收益，紫色瑞典蕪菁，青色瑞典蕪菁均備。歡迎賜購。


石灰硫礦劑已落伍 進步的柑農友使用コロナ  
コロナ是獨一無二的可濕性水和硫礦劑

コロナ是火燒柑、紅蜘蛛、銹病、象皮病的特效藥！

石灰硫礦劑的劣點

- ①易生藥害
- ②寒帶噴霧器
- ③不可與其他農藥混合使用
- ④有效期間短促僅約14~20日
- ⑤攜帶不方便

可樂農



(原裝進口供應)

コロナ

日本兼商株式會社 榮譽出品

臺灣總代理 經華貿易股份有限公司

臺北市涼州街20號 電話：41206

(臺北市郵政信箱第1764號)

\*誠徵苗栗縣、臺南縣、臺東縣、花蓮縣代理經銷商