

## 颱風季節黃麻留種三種方法

稻田裏作  
十石大豆較宜

【問】：一、黃麻颱風時如何留種。

二、怎樣鑑別好壞黃麻種子。

三、鐘麻是什麼？其品種那一品種最好  
種植。（善化鎮胡厝村三九號胡國在）

【答】：一、①生長後期遇颱風摧殘，  
祇須留有嫩芽，扶株，補施肥料，培土，灌  
水，使再開花結果，可以增加採種量。

②颱風摧殘後，選取分枝點高，而分枝  
少，且無病蟲害之優良單株，割取其梢部，  
以行距五〇公分，株距二〇公分，用改良繁  
插法，在水田扦插善加管理，則可開花結實  
可確保採種量。

③晚播採種：延至六月上中旬播種，麻  
林較矮受颱風之害較少採種量較增多。

二、好的黃麻種子光澤好，純無灰雜物  
，發芽率高。  
三、鐘麻又叫洋麻，或「安伯利」麻，  
爲黃麻代用作物，耐旱，適宜於壤土或沙質  
壤土，富有幾質，前作種過水稻而無線蟲病  
潛伏之排水良好旱地本省中南部均可栽培。  
以纖維爲目的，宜於二至四月播種，採種用  
者，宜延至六月播種。（季景元）

## 看天田適宜種紅豆

【問】：一、紅豆在本省西部，何時可  
以播種，種植。

二、栽培法如何？

三、何處改良場或試驗所，有種子試種  
。（苗栗縣三灣鄉大坪村六六號李宇）

【答】：一、紅豆在本省西部之播種期  
爲三月至四月，其栽培方法與大豆略相同，  
尤易發生旱害的看天田適於種植紅豆。

二、栽培要點：注意選種其栽植密度行  
距六十公分株距十五公分每穴播二至三粒種  
子，每百公畝之播種量三·六公升左右。其  
餘施肥及病蟲害防治依照大豆標準施行。

三、新竹區農業改良場辦理紅豆改良，  
洪再傳先生爲紅豆專家，如有不詳之處請向  
他並請教。（王進生）



作種植高雄五號大豆與十石大  
豆那種適合中部地方。  
二、中部種植裏作大豆最  
適合時期何時。

三、最底收量有多少。（  
彰化縣埔鹽鄉崑崙村彰水路八四號洪宏志）


彰化縣埔鹽鄉崑崙村彰水路八四號洪宏志  
二、臺中地區裏作大豆最適合時期何時。

三、裏作大豆每公頃產量最低八百公斤  
月上旬？如在十月十日以後播種，因氣溫低  
，大豆生育不良，將影響產量。

三、裏作大豆每公頃產量最低八百公斤  
，普通一千至一千五百公斤。（劉文慶）

## 防治鐵甲蟲

可用BHC



【問】：農田稻  
發生鐵甲蟲未知應使  
用什麼農藥治療？（  
鹿港堵南里十八號尤  
道德）

【答】：稻鐵甲蟲可在發生初期撒布五  
至十%DDT粉或一至三%BHC粉，每分  
地五至六公斤防治。但如果要防治水稻螟蟲時  
，可將依必安或必愛用等治螟蟲劑噴到葉部  
，也可一併防治鐵甲蟲。（張良傳）

## 草菇不宜在大樹下種植

【問】：一、草菇可種於屋外大樹下否  
？

二、下種後要怎樣管理？

三、在來草及蓬萊草那種好？（彰化縣  
溪湖鎮湖東里大溪路九號洪恭想）

【答】：一、草菇不宜於大樹下種植。

二、草菇管理比較容易，栽培後注意噴  
水不可一次澆得太多，如乾燥時宜分數次行

三、在來草栽培草菇較佳。（胡開仁）

# 大滅速

## Roxion® 20%·50%

### 樂可信

甲基巴拉松（メチルパラチオン）

殺也特（サイオビット）

連勝貿易有限公司

臺北市太原路20號 電話：50669號

