


農友們看了上圖，可以明瞭「熱」，對於乳牛產乳量的影響。其實，不論那一種家畜或家禽，都會受外界不良環境的影響而減產。尤其是在本省飼養乳牛，因為地處亞熱帶，高溫多濕，過去，大家祇注意品種的選擇，飼料的配合和管理的改進。其實，今後對於牛舍的防風，一定要加以改善。才能使乳牛發揮它

乳牛怕熱，太熱了會影響產乳量，假如農友們要新建牛舍或修改舊的，最好參考本文，使牛舍能通風防熱。

牛舍熱・乳量低

牛舍要防熱！



• 澄祖謝 •

最高的產乳量。

根據美國農部和南方各州試驗站的報告，乳牛當氣溫上升，尤其到華氏八十五度以上時，體溫升高，呼吸增快更是明顯。結果食量減少，泌乳量下降。從此可知牛舍防熱的重要性減少，下面這些方法如能切實實行，相信會增加您的收益。

通風好・會增產

牛舍應選擇通風良好的地方，或在高地上建築。

建造牛舍最好要東西狹長，可以減少日光的照射。

牛舍頂離地要高，且有天窗，使空氣流通，舍內涼爽。

牛舍內隔欄，最好用粗鐵網，可使空氣流通，如用木板條，要多留空隙。

假使可能的話，牛舍四週最好有較大的空間，和其他的建築物連接以利通風。

牛舍四週可植樹遮陽，減低熱度，但不要過份緊密而遮蔽天日。

* * *

一 家畜也要吃鹽

鹽，對於家畜的功用很重要，缺少了會發病，太多了要中毒。你知道牛、羊、馬、鷄要多少食鹽量嗎？

缺鹽發育受阻

牛、如果二、三個月吃不到鹽，便會很想吃鹽。拖上一年後會消失食慾，減少體重和泌乳量，甚至會突然死亡，當前面這些急症徵狀發生後立刻給鹽就可復元。普通牛在放牧期每隻每月需要食鹽一磅到兩磅半，泌乳

羊要〇・六磅。馬每匹每天需要鹽五十公分。



來客人仔日一有
伊給炎直肉鷄
(鮮新不)青不肉到吃客人
(鮮推思意好不)解勢壞意好人主



(吃得不捨) 吃甘不仔鷄好拜
客入請等無營肉鷄
(營妥不) 營好營保肉鷄
去壞對仔天三二



禮厚真仔伯土阿
拜來鵝殺鵝公天
公地土祖馬公天
透送拜總總神諸

吃門件愛趁青！

劉興欽