


農友們看了上圖，可以明瞭「熱」，對於乳牛產乳量的影響。其實，不論那一種家畜或家禽，都會受外界不良環境的影響而減產。尤其是在本省飼養乳牛，因為地處亞熱帶，高溫多濕，過去，大家祇注意品種的選擇，飼料的配合和管理的改進。其實，今後對於牛舍的防風，一定要加以改善。才能使乳牛發揮它

乳牛怕熱，太熱了會影響產乳量，假如農友們要新建牛舍或修改舊的，最好參考本文，使牛舍能通風防熱。

## 牛舍熱・乳量低

## 牛舍要防熱！



### • 澄祖謝 •

最高的產乳量。

根據美國農部和南方各州試驗站的報告，乳牛當氣溫上升，尤其到華氏八十五度以上時，體溫升高，呼吸增快更是明顯。結果食量減少，泌乳量下降。從此可知牛舍防熱的重要性減少，下面這些方法如能切實實行，相信會增加您的收益。

### 通風好・會增產

牛舍應選擇通風良好的地方，或在高地上建築。

建造牛舍最好要東西狹長，可以減少日光的照射。

牛舍頂離地要高，且有天窗，使空氣流通，舍內涼爽。

牛舍內隔欄，最好用粗鐵網，可使空氣流通，如用木板條，要多留空隙。

牛舍四週最好有較大的空間，不和其他的建築物連接以利通風。

牛舍四週可植樹遮陽，減低熱度，但不要過份緊密而遮蔽天日。

\* \* \*

## 一 家畜也要吃鹽

鹽，對於家畜的功用很重要，缺少了會發病，太多了要中毒。你知道牛、羊、馬、鷄要多少食鹽量嗎？

缺鹽發育受阻 三個月吃不到鹽。

牛、如果二、三月份吃不到鹽，便會很想吃鹽。拖上一年後會消失食慾，減少體重和泌乳量，甚至會突然死亡，當前面這些急症徵狀發生後立刻給鹽就可復元。普通牛在放牧期每隻每月需要食鹽一磅到兩磅半，泌乳中的牛還要多些。羊每隻每月需要鹽一磅，小羊要〇·六磅。馬每匹每天需要鹽五十公分。



來客人仔日一有  
伊給炎直肉鷄  
(鮮新不)青不肉到吃客人  
(鮮推思意好不)解勢壞意好人主



(吃得不捨) 吃甘不仔鷄好拜  
客入請等無營肉鷄  
(營妥不) 等好營保肉鷄  
去壞對仔天三二



禮厚真仔伯土阿  
拜來鵝殺鵝公天  
公地土祖馬公天  
透送拜總總神諸

吃門件愛趁青！

劉興欽

飼飼料中的鹽應配成千分之五的濃度，鷄如缺鹽體重減輕，產卵量減少，並且會引起食毛癖等。如果發現有這種情形時，要立即設法矯正食鹽的給與量，混入飼料內或放在畜舍內，使家畜任意舐食。

**過多就會中毒** 飼料中含鹽太多，相反的，畜禽或家畜採食過份的鹽量，也會引起鹽的中毒。普通牛、羊、豬等動物鹽中毒的徵狀是多渴、腹痛和腹瀉，食慾低，體弱消瘦，嘴變紅而乾燥，多尿，泌乳量減少，半盲或全盲，呼吸困難，從後腿開始麻痺，漸漸會死亡。鷄的鹽中毒時，全身水腫，遲鈍，極渴，請農友們不要忽略、注重預防。（季培元）

**第一週** 仔豬如果沒有母豬餵奶，祇要耐心用人工乳來餵它，照樣可以長大，八週以後可以吃中猪飼料。

仔豬可以用人工哺乳，飼養的時候最好使用比鷄的育雛箱稍為大一點的木箱作為哺育箱，用電熱或其他火力，經常保持攝氏卅七度左右的溫度。仔豬生後三、四天如果吃過母乳的，以後的發育生長或對疾病抵抗力都很好，沒有吃過初乳的小豬，雖然耐心哺育也可以成功，但飼養管理比較

## 怎樣替仔豬餵人工乳？


仔豬出生後兩週內，人乳的調配，

**第二週** 素的優良奶粉，按照說明書沖泡。起初五天以內還要另加維生素K，每頭三毫克。另外，一千西西牛奶再加十分之一個蛋黃和礦物質，包括硫酸鐵四十九・八毫克，硫酸銅三・九毫克，氯化錳三・六毫克，碘化鉀〇・二六毫克的混合物五毫克加在一千西西牛奶中。

**第三週** 的猪舍裏去飼養。

當家畜發生鹽中毒徵狀時，最重要的須立即除去鹽的來源，例如不再給含鹽的飲水或飼料，給予大量的清水，注意護理，體弱消瘦的家畜，注射葡萄糖。但一切治療工作應該就近延請獸醫診治。


食鹽像其他礦物質養分一樣，需要量雖少，但不可或多或少，要根據家畜身體的需要量而定，普通人大都不注意，因此會有抑制生長、生產和不健康等的情形發生，請農友們不要忽略、注重預防。（季培元）



（標達）西尼阿通無便  
看生就是醫，講他對青無對，伯士阿伐交生後。  
○（標達）



○去落不強吃人肚八  
吃伊給了以了仔腐便  
久，死要強仔腐便  
○次五四了去所便



意注愛管保物食  
時，天熱在着定一門吃  
○味氣好養滋吃好