

鷄飼料中的鹽應配成百分之五的濃度，鷄如缺鹽體重減輕，產卵量減少，並且會引起食毛癖等。如果發現有這種情形時，要立即設法矯正食鹽的給與量，混入飼料內或放在畜舍內，使家畜任意啄食。

### 過多就會中毒

相反的，畜禽飼料中含鹽太多，或家畜採食過份的鹽量，也會引起鹽的中毒。普通牛、羊、豬等動物鹽中毒的徵狀是多渴、腹痛和腹瀉，食慾低，體弱消瘦，嘴變紅而乾燥，多尿，泌乳量減少，半盲或全盲，呼吸困難，從後腿開始麻痺，漸漸會死亡。鷄的鹽中毒時，全身水腫，遲鈍，極渴，

糞便稀薄，脫毛，呼吸迫促，進而死亡。幼年鷄較老年鷄容易中毒，這可能因為幼年鷄還缺乏味感的緣故。但是羊對鹽的抵抗力較牛豬都較大。

當家畜發生鹽中毒徵狀時，最重要的須立即除去鹽的來源，例如不再給含鹽的飲水或飼料，給予大量的清水，注意護理，體弱消瘦的家畜，注射葡萄糖。但一切治療工作應該就近延請獸醫診治。

食鹽像其他礦物質養分一樣，需要量雖少，但不可或多或少，要根據家畜身體的需要量而定，普通人大都不注意，因此會有抑制生長、生產和不健康等的情形發生，請農友們不要忽略、注重預防。(季培元)

## 怎樣替仔豬

### 餵人工乳？

仔豬如果沒有母豬餵奶，祇要耐心用人工乳來餵它，照樣可以長大，八週以後可以吃中豬飼料。

#### 第一週

仔豬可以用人工哺乳，飼養的時候最好使用比鷄的育雛箱稍為大一一點的木箱作為哺育箱，用電熱或其他火力，經常保持攝氏卅七度左右的溫度。隨着成長發育的狀況把溫度漸漸的降低。

仔豬生後三、四天如果吃過母乳的，以後的發育生長或對疾病抵抗力都很好，沒有吃過母乳的小豬，雖然耐心哺育也可以成功，但飼養管理比較

麻煩些。

#### 第二週

仔豬出生後兩週內，人工乳的調配，可以用「勒吐精」或「森永」牌等配有維生素的優良奶粉，按照說明書沖泡。起初五天以內還要另加維生素K，每頭三毫克。另外，一千西西牛奶再加十分之一個

蛋黃和礦物質，包括硫酸鐵四十九·八毫克，硫酸銅三·九毫克，氯化錳三·六毫克，碘化鉀〇·二六毫克的混合物五毫克加在一千西西牛奶中。

餵人工乳，可使用附有奶頭的奶瓶，一頭一頭餵。每天餵八到十次讓它吃飽為止。約經一週，試把人工乳放在小飼


槽內，如果能自動吃的話，不必再用奶瓶餵，這樣可以節省餵奶的麻煩。

#### 第三週

第三週以後，可以開始餵飼料，漸漸減少牛奶而增加飼料，到第五週完全停餵牛奶，這時可以移到比較溫暖和清潔的豬舍裏去飼養。

所用混合飼料中各種材料的百分數如下：蔗糖十五，葡萄糖十二·五，玉米粉十三·七五，大豆粉七，魚粉五，豬油二·五，第母粉一，氟化鋅〇·一五，第二磷酸鈣〇·三五，碳酸鈣即石灰石〇·二五，碘化鹽〇·五，Vita和抗生素補助飼料二。

上面那種配合飼料，可以餵到八週為止，以後便可給予中豬飼料，照正常的方法繼續飼養。(張聯欣)



醫 生 就 醫  
了 吃 代 無 後  
對 是 阿 通  
講 他 門 伯 西  
。 ( 標 達 )



勉 強 吃 了 所 便  
給 以 仔 肚 入  
吃 後 仔 痛 去  
吃 不 強 仔 去  
去 落 要 死 了  
， 久 次 五



食 其 門 吃 好  
保 管 在 養 滋  
注 意 熱 氣  
， 時 天 青 味