

怎樣防治番 茄晚疫病 ？害蟲病菇洋

信 悟

在七月底舉行的臺灣植物保護技術審議委員會本年度年中大會，根據各試驗場所的最新試驗結果，修訂了部份植物保護推廣方法。本刊十四卷十六期已刊出經過修訂蔬菜害蟲防治方法；下面是防治番茄晚疫病和洋菇病蟲害的最新規定。

番茄晚疫病

一、發病初期開始噴射左表藥劑（任

選一種）防治，施藥時應噴射葉片的上下兩面。藥劑名稱，每公頃用藥量和稀釋倍數如下：

二、低溫多濕季節，為預防發病，可施用「大生二二」三百至四百倍稀釋液，每隔十天噴射一次。

原推廣方法「番茄和馬鈴薯晚疫病」，番茄馬鈴薯分開另列一條。新方法除有「大生二二」和「大生七八」二種外，增列「大生精液劑」「安收多」「抗病」三種新藥。

農林廳受理「大生精液劑」（日本東京有機化學工業株式會社出品，臺灣華豐行代理），「安收多」（西德拜耳公司出品，中德貿易公司代理）和「抗病」（西德巴斯福公司出品，永松貿易公司代理）三種藥劑對番茄晚疫病的委託試驗，經由蔬菜病理技術小組委交鳳山園藝試驗所，以現行推廣之「大生二二」為標準藥劑，辦理藥效比較試驗結果，三種新藥的效果都比「大生二二」為佳，所以列入推廣。

藥劑名稱	稀釋倍數	每公頃每次用藥量	施藥次數	備註
大生二二	400	二	一、七天 一、七天 收穫前 止用藥	
大生七八	400	二	一、同 一、同	
大生精液劑 (Dithane Steamless)	500	二	一、同 一、同	
安收多 (Antacol)	500	二	一、同 一、同	
抗病 (Polyram Combi)	500	二	一、同 一、同	

洋菇病蟲害

（一）栽培前：菇舍處理：（1）可密閉菇舍的門窗加設尼龍細紗網，以防菇蠅飛入為害。

（2）堆肥上床前，一至二週，菇舍內經大掃除後，以「DDT、福爾馬林」混合藥液（十公升水中加入一百公克七五%DDT可濕性粉劑，及一百至二百公撮工業用「福爾馬林」，每坪用DDT約二公克，「福爾馬林」二一四公撮，即每坪稀釋藥液二百公撮），噴射菇舍內之牆壁、屋頂、地面、棚架等處，噴射後將菇舍密閉一天。

菇舍消毒後，如有跳蟲，應立即在菇架，菇舍內角落和地面等處，每坪噴射五〇%DDVP乳劑二千倍稀釋液一公升。最低菇床應離地面二十公分。



High Glass
Mary TOILET SOAP

品質高尚 香味芬芳

消毒殺菌 保健康美



瑪莉香皂 · 藥皂

G-11