



微病育晚茄番

(九) 蝗蟲防治：如發現蝗蟲，在菇舍內牆角噴射，每坪噴可濕性粉劑五十倍稀釋液，但切勿噴射牆以外的地方。  
洋菇收完後，儘快搬走堆肥，並立即

- (二) 堆肥處理：堆肥醣酵度達攝氏七十度左右，以便殺死潛伏的病菌害蟲。最後一次翻肥時，一面堆積，一面在新堆的堆肥周圍約一臺尺寬處，以「D T・鐵地旺」混合藥劑噴射。一公升中加入七五% DDT 可濕性粉劑二公克，二十% 「鐵地旺」可濕性粉劑二公克，十坪用堆肥十五公升。
- (三) 覆土處理：覆土用表土下一尺之土壤，並用「福爾馬林」五十倍稀釋液消毒，再蓋上玻璃布，二十四小時後撤去玻璃布，將土壤散開七天左右，使「福爾馬林」氣味消失後才可使用。
- (四) 栽培中：堆肥上床後每隔一個月，將菇舍門窗尼龍細網噴一次六十% 「大利農」蠅乳劑五十倍稀釋液。
- (五) 晚茄番發病處理：在菌床上每隔二至六天噴射一次四% 「除蟲菊精」二千倍稀釋液，或六% 「除蟲菊」精三千倍稀釋液，連續噴射三至五次，至瘦蠅幼蟲消失為止，每坪施用稀釋液二至二·五公升（噴藥可和灑水合併舉行）。
- (六) 經常噴射十分之〇·一五氯水（即一公升水加入三十% 有效氯漂白粉一公克）。發生褐斑病時，先將確病區洋菇全部採收後，施用「大生二二」五百倍稀釋液，每坪用量一至一·五公升藥液，均勻噴射在覆土表面，每隔五至七天噴射一次，連續噴射二次。

(七) 跳蟲防治：(1) 利用燈光誘殺。(2) 跳蟲較多的菌架，地面和牆角等處，每坪噴射五〇% D D V P 乳劑三千倍稀釋液一公升。

## 農物成份標準 保證品質優良

### 經 銷 處

臺北：新蓬萊農業行	臺北市迪化一段二四九號
宜蘭：隆豐農產公司行	臺北市迪化街一段 231 號
桃園：慶年農業行	桃園縣中壢鎮民權路 35 號
苗栗：惠農行	苗栗縣竹南鎮八德街四四號
南投：泰生保畜行	南投縣南投民權路一三號
臺中：進豐行	臺中市向上路一段二號之五
臺中：生光農業行	臺中市興中街十三號
彰化：義豐行	彰化市宮崎鄉中正路 227 號
彰化：德榮行	彰化市民生路一六六號
雲林：志豐行	雲林縣虎尾鎮光復路 48 號之 1
嘉義：華豐農業行	嘉義縣義竹鄉六桂村 3 鄉 199 號
臺南：蓬萊農業資材行	臺南市公園路一七三號
高雄：高農種苗行	高雄市林森一路 150 號
屏東：元山化工行	屏東市中正路 90 號
花蓮：輝揚種子行	花蓮市中山路 8 號（彰化銀行對面）
臺東：	



中農化工廠股份有限公司出品

總公司：臺北市南陽街廿一號 電話：三一六六〇·二八八九五  
工 廠：臺北縣景美鎮中正路三一七號 電話：九三二一五四

現貨供應