

# 農業信

## 香蕉果指變黑是黑星病

【問】：一、香蕉果指發生黑色麻點，甚至全果房的果指都有，是何原故？  
 二、果實尚未成熟果指裂開是何緣故？  
 三、果指尖端，皮色紅黃，是否因日照關係，如何防治？

四、結果蕉株的假莖，或因果實過重，或稍被風吹，即行折斷是何原故如何防治？  
 (高雄六龜中庄一六八號黃鴻讚)

【答】：一、果指發生黑色麻點係黑星病，嚴重時果皮全部染患病斑，其防治法(1)果實套袋(2)噴4-1-A式波爾多液即四公克硫酸銅，四公克生石灰，一公升水。  
 二、土壤極度乾燥而灌溉或水分過多，且兼日晒，因而起裂果現象，改良蕉園排水與灌溉，且用套袋予以防止。  
 三、果指尖端皮色紅黃，係受日直接照射所致，利用套袋可防止。  
 四、結果蕉株假莖折斷，除因象鼻蟲為害外，大都因施肥肥不足之影響，因此氮磷鉀三要素比率應為二比一比六即氮鉀之比率為一比三(王兆全)



## 黃花黃蕊金針菜品種最佳

【問】：一、金針菜是否怕遮蔭？  
 二、利用香蕉園，種植金針菜可以嗎？  
 三、金針以何品種最佳？那裏出售金針苗？

## 較差。

【答】：一、遮蔭地點之金針菜其生育較差。  
 二、香蕉園裏種植金針菜等不太適合，但如周圍並無遮蔭則可以栽植。  
 三、金針菜品種以黃花黃蕊品種最佳，黃花黑蕊次之。金針菜出很少有人出售。  
 四、金針菜之施肥應以堆肥及豬糞尿或人糞尿為主，每十公畝各施一、二〇〇公斤左右，另加施十二公斤過磷酸鈣及六公斤左右的氯化鉀為宜。  
 五、至於香蕉園裏之作物宜向嘉義園藝試驗所尋問。  
 六、雜交玉米具有種種優勢，其產量高於普通品種一倍左右。  
 七、雜交玉米以作飼料為主，飼料行均有收購。  
 八、玉米之脫粒應用玉米脫粒機，宜向嘉義朴子臺南區農業改良場玉米中心尋問。(王進生)

四、金針菜的施肥，與管理如何？請介紹幾種可以在蕉園裏間作的作物。  
 五、雜交玉米是否具有早熟豐產的特徵生育日期多久？  
 六、雜交玉米在鄉鎮農會是否收購，價格若干？  
 七、玉米以何種方法脫粒最經濟(嘉義縣中埔鄉鹽館村下庄仔八號陳傳芳)



## 請你看一看

下列農友來信有地址欠詳有原址查無人被退回，請速補寄詳細地址以便回信。張智敏、林金水、陳水流、陳永富、李明雄、賴進興、彭進興。  
 此外，本社希望各位讀者今後務必要把姓名和通信地址寫在信紙上，這樣才夠迅速得到答覆。



阿南阿嬌



阿南阿嬌作唱山歌



阿嬌洗衫衫面愁



阿南安免煩惱  
好個消息

解決一切清潔問題！  
 家庭必有的良伴！

△南僑肥皂，全省最普遍之老牌子，最好洗的肥皂。南僑化工公司為求品質至上，服務顧客，特別裝置全世界最新式意大利肥皂製造機器，生產最優良、最好洗及最耐洗的肥皂。無論都市、鄉村都很適用，只要輕輕抹泡沫多，洗淨力大，去污力強，除垢迅速、真是省時省力又省錢。  
 △南僑肥皂，各鄉鎮雜貨店都可以買到，請各位多多選用，多多愛用

南僑化學工業股份有限公司



南僑肥皂真真正正  
好洗清潔手(不會)  
啊！確實洗好