



蘭花分殖播種


分株均可

【問】：一、古榕樹(盆景)如何栽培管理？須要何種肥料？種子或樹苗何處有售？如何繁殖？

二、蘭花如何分殖，施肥？(臺北市中山北路一段聖光幼稚園王鍾琪)

【答】：一、榕樹盆景的管理，要注意下述幾點：①所用的盆鉢要淺②平常澆水不要澆得太多③肥料不要施的太多，尤其氮肥的比率要比磷、鉀肥料少，至於樹苗在普通花苗店都可以買到，做盆景的榕樹是屬於小葉榕樹用扦插繁殖。

二、蘭花普通用分株繁殖，如果要大量繁殖或培育新種時則用播種繁殖，分株繁殖，到第二年即可開花，播種繁殖需要培養六、七年才會開花，施肥方法請參考豐年八卷十期二十五頁農業信箱欄內的「洋蘭需要施肥嗎？」(謝靜芬)



二期稻收穫前可種作番茄

【問】：一、二期稻作之糊仔番茄(地沙質)何種品種最適合？

二、水稻插秧後，在幾天後就要整地播種，幾天移植？

三、橫直之間隔多少？

四、每一分地多少株，肥料要多少？(三要案)(南投縣中寮鄉永平村一三一號廖泰盛)

【答】：一、二期稻作之糊仔番茄製作番茄之品種以馬娜里，寶冠兩種為宜。

二、二期水稻收穫前三〇—三五天，開始播種較宜。

三、栽植密度行距六〇公分，株距四五公分，如利用正條密植之田地，宜將行距放寬至六七·五公分，株距四五公分。

四、每十公畝栽植株數為三七〇〇株左右，三要案，氮素二五—二七磷酸十二—十五公斤鉀質二八—三二公斤。(王進生)

花蓮地區適宜種瓊麻

【問】：一、瓊麻(鐘麻)之栽植土壤以何種為適？新開墾，砂礫土栽植可以？


二、每公頃可栽多少株？株行距多少？年產量(單位面積)多少？

三、管理方法大概如何？(花蓮縣吉安鄉木瓜溪工作站廖大雅)

【答】：一、來函所稱瓊麻非鐘麻。瓊麻適宜於排水良好而富含鈣質之土壤種植，新開墾的砂礫土，如排水良好，注意增加土壤肥力，仍可栽種瓊麻，瓊麻生長期間須要高濕及適度的雨量，花蓮縣適於瓊麻生長。

二、瓊麻每公頃以種植五〇〇〇株較宜，栽培行距為二·五公尺，株距為一·八公尺，每年每公頃平均纖維收穫量為一·二五〇公噸左右。

三、瓊麻園的管理方法要注意下列幾點：(一)施肥，每公頃每年標準施肥量是尿素一八〇公斤，過磷酸鈣一八〇公斤，氯化鉀一〇〇公斤分次施用。(二)每年除草四到六次。(三)刈刈瓊麻種植後三至四年可行第一次收刈，此後每隔八至十個月收刈一次，第一次收刈應留葉二〇片，以保護雨季來臨前，以可溶性硫酸銨澆洗麻莖及刈口，颶風前後用一〇〇〇倍的一谷樂生(溶液噴灑)(賴銘立)



理作番茄馬娜里寶冠較佳

【問】：一、二期農作欲種番茄，有比較適合品種嗎？

二、霜害及濃霧害如何防治(臺中縣大肚鄉管埔村十七號楊瑞池)

【答】：一、第二期農作番茄品種以「馬娜里」及「寶冠」兩種為宜。

二、番茄不耐低溫故於寒流浸襲上空之前，先行開地灌水並以燻煙法促使寒流易於流動，且提高濕度減少被害，如有噴灑灌溉設備，宜於夜間繼續噴水以免結霜，濃霧為害以海岸地區為甚，因帶鹽分易引起植株枯萎落果，故宜設置防風林，防止霧直接吹襲植株。(王進生)

以黃豆小麥並用純粹培養菌釀造：

金蘭牌醬油

便宜又好吃的調味品

蓬萊高級醬油

◎請將本廣告剪下直接提向本公司左列各處當即贈送金蘭及蓬萊醬油各一瓶以酬勞

- 大同商事公司：桃園鎮民族路五七號
- 基隆連絡處：基隆市孝三路英雄巷三號
- 臺北連絡處：臺北市重慶北路二段二三九號
- 新竹連絡處：新竹市民族路一一八號
- 臺南連絡處：臺南市自強街一巷三號

福利來



享譽已久 公認的效力

Furella
「フレラ」

新貨已到 即請購用

育雛好消息!!

八折大優待

鷄白痢的特效藥「福利來」為供應新雛育成的成功特別實行八折大優待。每雛一箇月祇花八角藥費，保證百養百成，既可安心又可獲利。

「說明書備索」

各地 均售

總代理：英商卜內門洋碱有限公司
臺北市中正路一八〇〇號
經銷處：國際家畜藥物廠
臺北市長安東路一段三九號