


提早防治豬蛔蟲！

簡明龍

全省百分之八十的豬隻，不論大小都有蛔蟲寄生，主要是臺灣高溫多濕，最容易發生寄生蟲，尤其是豬蛔蟲的感染率最高。要能認眞的提早防治。

談損失：每頭三百元

豬蛔蟲的蟲體像蚯蚓，兩端狹小，黃白色或粉紅色，長約十五至廿五公分，最長的有一英尺。牠的寄生，是由於豬隻口腔感染蛔蟲卵而來。一條成熟的雌蛔蟲，每天約可產卵廿萬個，蟲卵隨大便排出，如遇氣候適合，只需十天就能感染豬隻。

豬隻中以小豬最容易被感染。蛔蟲通常寄生在小腸，攝取豬隻的營養分，妨碍豬隻的發育。

通常，仔豬斷奶時，如果沒有蛔蟲寄生，繼續飼養六個月，體重可達九十公斤。但如有蛔蟲寄生的豬隻，斷奶後繼續飼養六個月，重症的只有五十八公斤。次重症的只有六十五公斤。即使是輕症的也只有八十一公斤。

照這樣計算，有蛔蟲寄生的豬隻，平均每頭要損失十七公斤左右。以現在肉豬價格每公斤二十元計算，每頭肉豬約損失三百四十元。所以豬隻蛔蟲寄生，在不知不覺中所受的損失是很驚人的。

驅蟲外：環境要清潔

蛔蟲症的診斷方法分兩種：㈠用顯微鏡檢查糞便。如糞便中發現有蛔蟲卵，即可斷定有蛔蟲寄生。㈡可觀察豬隻外表。有蛔蟲寄生的豬隻，食慾不振、皮毛粗硬、皮膚乾燥、軀體削瘦等現象。此外，並可發生頑固下瀉、腹痛、貧血、昏睡、呼吸困難、肺炎、黃疸等病症。


防治蛔蟲最好的方法，應把豬隻施行定期除蟲。在什麼時候施行除蟲最適當呢？

肉豬：最好能施行兩次：第一次在仔豬八週齡，即生後五十六天，第二次在第一次除蟲後兩個月爲宜。種母豬：在分娩前即生產前兩個月除蟲最好。種公豬：每隔四個月除蟲一次。

豬隻除按期除蟲外，在日常管理方面應注意下列幾點：豬舍平常要保持清潔，讓日光充分晒入。豬舍如有泥土的運動場，應在每窩小豬遷入前，或每隔四個月更換一次。更換的方法是鏟出表土四至六寸，換以清潔的沙子。

千萬不可信密醫！

劉興欽



阿明與仔（老）和中人（老）人（少）一天村裏來了一個伊是醫生，明看給病人的你，講伊對人病暗死會人

阿明與仔（老）和中人（少）一天村裏來了一個伊講人對醫生，明高超再陀華百病看給看給你的，講伊對人病暗死會人

阿明與仔（老）和中人（少）一天村裏來了一個伊講人對醫生，明高超再陀華百病看給看給你的，講伊對人病暗死會人

豬糞要經常掃除，旁邊應鑿一個糞坑，用來貯藏糞尿。

當母豬將要分娩時，應該替牠洗淨腹部和乳房，產後哺乳期中，還要替牠洗澡，以免仔豬從母乳的身上感染蛔蟲卵。能注意這幾點，就可以減少蛔蟲感染和傳播的機會。

餵藥粉・效果很良好

下面介紹兩種對蛔蟲有效的藥品，供農友們參考使用：

牛豬安，原名是 Neguvon：豬的體重每十公斤用三公分，混合在飼料裏給豬吃，可得百分之百的效果。

Parvex，這種藥是 Piperazine的製劑。按豬隻體重計算，每公斤用〇・五六公分，混合在飼料內給豬隻吃，有百分之九十八的效果。

打蟲藥大多是粉劑，粉劑的藥物很難把它送進豬的肚子裏。怎麼辦呢？本文作者建議你用一種常用的方法，就是先把藥粉研細，在餵料前，先從全部飼料中取出一小部份，把藥粉放進這一小部份的飼料裏混合得很均勻，然後再倒進飼槽內，讓每頭豬都能吃到。這樣因爲在剛開始餵豬時，豬隻的肚子都很餓，常會拼命的吃，這樣就可以把全部的藥都吃進肚子裏了。

不要母鷄賴抱

季培元

本文介紹你用藥物荷爾蒙，防止母鷄賴抱，效果比舊方法好。

賴抱鷄・產卵低

所謂賴抱，就是母鷄每產卵十幾枚後就喜歡躲在窠內，懶得走動，偶然走出來時顯得步伐不穩，羽毛散亂，並且發出「咯咯」的聲音。在這一段時期食慾減退，體重變輕，抵抗力也弱，容易傳染疾病。

本地鷄的賴抱期長達一、二個月不等，不但減少產卵量，而且在賴抱期間體質瘦弱，必須經過長時期的飼養，才能恢復正常。所以這一種賴抱性除了用作孵化小鷄以外，很不經濟。下面是兩種藥物荷爾蒙的用法：

雄性素・很經濟

雄性素（Testosterone propionate），當發現鷄賴抱後，立即行肌肉注射五至十公絲，普通就可以止抱。如果無效，可用同等的劑量作第二次注射應該有效。這種「雄性素」，市面上有得買，高單位的比較便宜，普通十西西裝每瓶約五十元。每西西有五十公絲，所以每瓶可注射五十至一百隻賴抱鷄，平均每隻賴抱鷄只費新臺幣五角至一元，很經濟。

助孕素・也便宜

助孕素（Progesterone），也是一種荷爾蒙。在發現鷄賴抱後即行肌肉注射五至六公絲，普通亦可以止抱。如果無效時，亦可用同等的劑量作第二次注射應當有效。本藥亦有市售，高單位的較便宜，普通每西西裝的有二十五公絲。十西西裝的每瓶約七十元，每瓶可注射賴抱鷄四十至五十隻，平均每隻賴抱鷄約費新臺幣一元四角至一元七角左右，雖然比雄性素略貴，但可能較爲有效。

上述兩種荷爾蒙亦可用於火鷄的賴抱，同樣的作肌肉注射，但所用的劑量要比普通母鷄多些。

