

- (1) 五十% 「大滅速」乳劑一千倍。
- (2) 五十% 「馬拉松」乳劑五百倍。
- (3) 二十五% 「益加津」五百倍。
- (4) 二十% 「固殺松」乳劑四百倍。
- (5) 二十五% 「米賜多愛」一千倍。

## 天牛類

**爲害情形** 爲害柑桔的天牛雖有多種，但是值得注意的是星天牛和桔天牛等。星天牛蟲體黑色有光澤，且體、腳和觸角均有白斑，體長二十五至三十五公厘，雌蟲大，雄蟲小。每年四至十月間出現，南部較北部出現期略早，一年完成一世代，成蟲常食害葉和枝皮，卵產於離地一公尺以下的幹部和地面根部，初孵化的幼蟲蛀食皮下形成層，逐漸蛀入木質部為害。被害柑桔呈樹勢衰弱或枯死，易遭颶風折斷。

**防治方法** 可在天牛成蟲出現期每一或二月，用五十% 「地特靈」可濕性粉劑一百倍或十八·八% 「地特靈」乳劑三十六倍，噴射於產卵處防止產卵。

## 椿象類

**爲害情形** 爲害柑桔的椿象也有多種，但是習性都相近。因為被驚動時常常排放臭氣，所以又叫「臭青龜仔」。較嚴重的有角肩椿象，成蟲蟲體扁平，深綠色，前胸背向兩側突出，並略向後變而先端尖銳，體長二十公厘左右，口器針狀，刺入果實中吸食養液，被害果實往往脫落。卵成塊狀，一二十粒整齊排列產於葉上，若蟲期行動敏捷，爬行果實上亦吸食養液。

**防治方法** 在發生期（六至十月），每二十至三十天施藥一次，任選下列藥劑一種使用：

- (1) 五十% 「葵文」可濕性粉五百倍。

- (2) 五十% 「大滅速」乳劑一千倍。
- (3) 五十% 「滅克隆」可濕性粉一千倍。

## 锈壁虱

**爲害情形** 銹壁虱是一種非常微小，肉眼較難看見的小動物，體長僅有〇·一二至〇·三公厘，淡黃色，前方大，後方小，略成長三角形。通

常行孤雌繁殖，平時為害葉和嫩枝，有果實時多集中為害果實，破壞果皮油胞，以致果皮變為焦黑，如生銹狀無法長大，通稱「象皮病」或「火燒柑」，在高溫抗旱時期發生尤多。

**防治方法** 在發生期（六至十一月）每一至二月，用下列任何一種藥劑噴射於果實和葉片上：

- (1) 「大生七八」可濕性粉一千倍。
- (2) 二十五% 「克氯苯」乳劑一千倍。
- (3) 石灰硫礦合劑八十倍。
- (4) 九十五% 可濕性硫礦粉一百倍。


## 紅蜘蛛

**爲害情形** 是很微小的紅色小蜘蛛，用肉眼可見到，通常在葉背較多，被害葉和果實呈蒼白色，好像營養缺乏似的，生育受阻，全年發生，尤以乾旱季節特別嚴重，可致落葉或落果。

**防治方法** 隨時檢查葉背和果實，如發現有紅蜘蛛為害，可任選下列一種藥劑防治：

- (1) 二十五% 「克氯苯乳劑」一千倍。
- (2) 十八·五% 「開路生」乳劑四百倍。


（下接第二十一頁）



蟲成牛天星桔柑

# 東亞日光·電燈泡

名第一獎品質 像金部濟經 獲榮



中國有限公司



中日合資



中國電機公司