

(3) 土壤消毒：發病土壤於整地前十天施用「氬化鈣」一百至一百二十公斤（全園撒布），然後犁耕耙平，以消毒土壤。

(4) 噴射預防藥劑：於發病前（高冷地五至六月，平地九至十月，噴射「大生七八」四百倍稀釋液加用展着劑，繼續二至三次，或噴射「賜保根」三百五十倍稀釋液。

(5) 防治害蟲：噴射「大利農」八百至一千倍稀釋液，或二五% DDT 乳劑五百倍稀釋液，以防治黃條葉蟲、小茶蛾和其他害蟲，使葉部無傷口，減少病菌傳染的機會。

(6) 注意施肥管理：施肥間拔等工作應等朝露乾時舉行，工作時應盡量避免踏入株間，以免引起擦傷。不要使用新鮮人糞尿，以防止肥傷發生。施肥、除草作業，應在播種後或定植後四十天以內完成。

(7) 發病株的根部，應儘量除去或埋沒於土壤中一公尺左右深處，



以免下雨時混在土壤中，隨着泥土傳染到葉部。

贈送

蔬菜

種子

「球莖甘藍」、「改良青梗白菜」，新竹區農業改良場採種，贈送「豐年」讀者，希望試栽的農友，請照下列手續來信：

- ① 準備紙質較厚的信封，寫好自己的姓名地址，註明所需種類（每人限送一種），上貼八角郵票。
- ② 把這個信封，裝在另外一個信封裏。
- ③ 外面信封貼郵票後，寄「臺北市伊通街一〇六巷二七號豐年社讀者服務部甲」。

▲最新水稻紋枯病驅除用液劑

臺灣省農林廳農藥登記證農藥字第 381 號
審定商標中臺字第 19124 號
聯合商標註冊號數臺字第 9724 號



新阿蘇仁液劑

製造元：日本イハラ農藥株式會社

進口商：靜興企業有限公司

地址：臺北市承德路83號三樓 電話：51023 52023

現貨供應：年豐農藥行 翁博鈞
嘉義縣義竹鄉六柱村199號 電話：義竹局24號

聯豐行 翁博裕
屏東市民生路194號 電話1359號



日本原裝