
時，約需苗床十五坪，播種後二十五天移植。沒有灌溉設備的應直播，本田要南北向栽植，行距五十至七十五公分，株距十至十五公分，這樣可以防止雜草發生，提高單位面積產量。每穴直播種子三至四粒，覆土二公分，播種後每穴留二株，二十五天內還留單株培育。糊仔移植應在水稻收穫前十五天以內定植於小土堆上（二期單期作田適用），並應還陰天栽植。又因紅花葉部和花毬有刺，爲日後管理方便起見，應每隔四至五公尺保留稍寬的行路溝。

注意管理・提高產量

紅花適應性很強，生育期也稍長，但是及時而良好的管理，仍能使發育更完全而提高產量。間拔、中耕、除草、追肥、灌溉等工作應適時舉行。生育期中並應勤行病蟲害防治，如有病株，應即拔取集中燒燬。生育後期應特別注意排水，保持田間乾燥。

採花作藥・採子搾油

紅花如供採收花瓣，應在由黃色變橙紅色時剪取，每十公畝可採收一百六十至二百二十公斤。如果採收種子供搾油，應俟花毬全部乾燥，種子成熟時整株拔取晒乾後脫粒；每十公畝種子產量約三百公斤，肥沃土地和週密管理時可達四百公斤。種子經粉碎後即可供搾油（不必經炒熟）。



成熟的紅花種子

農業園

△過去經常爲本刊撰寫大豆稿的高雄區農業改良場技正劉文慶先生，已調任花蓮區農業改良場場長；原任花蓮區農業改良場場長范則堯先生，調派省農林廳簡任技正。

△臺中區農業改良場農藝課課長余慶東先生，奉准於上（九）月一日退休。余課長從事農藝作物，尤其是水稻的研究，將近三十年，對本省農業貢獻很大。

△前任省農業試驗所植物病理系主任洪章訓先生，數年前參加我國駐越南農業技術團工作，任滿後應聘任美國羅門哈斯公司的技術代表，最近返回臺北。農友們常用的「大生二三二」和「大生七八一」兩種藥劑，就是該公司的出品。

DUPHAR

新太豐收 乳劑
Phillips Duphar M-parathion E.C.
RoXion® 20%·50% E.C.
樂可信 乳劑（大滅速）
Thiovit 80% W.P.
殺也特水和劑
連勝貿易有限公司
臺北市太原路20號　電話：50669號