

中部秋冬水田裏作 糊仔結球白菜栽培法

廖梅桂

選用適宜

裏作的品種

本省中部地區，在秋季水田裏作栽培的蔬菜種類很多，其中，以結球白菜銷路較好，能在短期間獲得相當優厚的收益。茲將結球白菜的水田裏作糊仔栽培法介紹於後，以供一般農友做參考。

現在本省引進的品種很多，下列二品種是適宜秋冬水田裏作，較有栽培價值的：
漳浦中生包心白菜：葉面光滑，葉球近長球形或短橢圓形，品質優良，產量高，抗病性強，適宜早期水田裏作糊仔栽培。

五十五天成功結球白菜：葉質似漳浦包心白菜，但葉球形狀近包頭連結球白菜，如果管理得當，每球重達二·五公斤以上，品質良好，定植後約五十天左右成熟，栽培容易，產量高。（如需本品種子，可向彰化市南門市場農生種子行洽購）。

結球白菜性喜溫涼氣候，溫帶性品種發育期以攝氏二十度較為適宜，又結球期以攝氏十五至十八度較好。但是漳浦包心白菜比溫帶品種需要較高的氣溫，就中部地區氣候而言，自第二期水稻收穫後至次年第一期插秧前這一段時期氣候情形最適合結球白菜生育。

栽培土地最好選用排水良好灌溉便利的砂質壤土或粘質壤土水田，如能選用正條密植器（八寸×八寸）插秧的田地，整地定植種植工作都很便利。

刈稻前二十五日播種

秋冬水田裏作糊仔栽培，通常用育苗移栽法，可在水稻刈前二十五至三十日播種育苗。苗床選用排水良好的砂質壤土或粘質壤土

耕鬆，並施用腐熟堆肥，充分混入土中後作畦。種子用撒播法疏播，並用肥土（田土與堆肥各半混合）覆土，再用稻草覆蓋畦面，充分澆水。發芽後間拔二至三次，使株距保持十公分左右。

糊仔整地·做成土堆

水稻出穗後收穫前十日，將田水排出。等到適濕時，自田埂起留稻行三行把稻株撥開，以每兩稻株五行撥開，在撥開的稻行間用鋤頭鬆土鋤起，於左右鄰隔稻行間每隔稻株二株為株距做小土堆，全區整地後再過一天即行定植。

挖苗定植·下午舉行

苗株在播種後二十五天左右就可以定植，如在水田糊仔栽培，於水稻刈前七日定植較好。定植前一小時，苗床須充分澆水，選健全優良苗帶土挖起移至本圃，每小土堆栽一株。定植工作最好在下午舉行。全區栽植完畢後必須行灌溉一次，以促進苗株成活。

中等土地·施肥標準

肥料的施用量，因土地肥瘠而不同，不能一概而論。右下表是中等土地施肥標準，可以做為參考（公斤/十公畝地）。

基肥在水稻收穫後隨時施於糊仔整地時掘開的小溝內，兼行大培土成畦。此後每隔十日施用追肥一次：第一次於株行內側距株十五公分處開淺溝施下後立即覆土；第二次施於株間兼行小培土；第三次宜泡水做成液肥澆施畦面。每次施肥後如能灌溉

一次，可以提高肥效。

肥料種類	總量			第一追肥	第二追肥	第三追肥
	總量	基肥	追肥			
硫酸銨	九五	三五	二〇	二〇	二〇	二〇
過磷酸鈣	六五	六五	一〇	一〇	一〇	一〇
氯化鉀	三〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
堆肥	二、〇〇〇	二、〇〇〇	二、〇〇〇	一〇〇	一〇〇	一〇〇

定植後五十天可採收

結球白菜的成熟期因品種而不同，如漳浦中生和五十五天成功結球白菜，概可在定植後五十天左右收穫。採收時應把先熟的先收；就是說，觀察葉球充分發育結球緊實而嫩白的，把它從根基部刈取，並修整外葉出售。

△「速滅松」和「阿蘇仁」最好不要混合。「速滅松」和「多穗」雖可混合，但是施用「多穗」常混用石灰，而石灰將影響「速滅松」的殺蟲效力。（洪維懷）
△馬蹄育苗適期為五至六月，不要直播。如果每分地產量超過二千公斤時，可能有一千五百元的純利；但如產量差，則收益不如水稻。（王進生）

寶冠のタネ



保證豐收

信用商標

標商下剪子種茄番購郵在
。元一滙少可上單撥劃在

子種茄番交雜

寶冠 (ホウカン) 一號、二號
夏冠 (サンマヒ) ニック一號、二號

每包淨重 五公克。
本月特價 三十元郵費在內。

日本原裝日本武藏野種苗園採種
空運來臺臺灣農業服務社供應

郵政劃撥 五一九九
號康導崑
。臺北市
信義路 3 段 147 巷
88 街 5 號